

アセタミプリド液剤 モスピランS L 液剤	取扱メーカー： 日農＊，日本曹達 原体メーカー： 日本曹達
成分： アセタミプリド〔ネオニコチノイド系〕……………18.0%	性状： 青色澄明液体 毒性： 劇物 消防法： 第4類・第3石油類（水溶性）・危険等級Ⅲ

【品目特性】……………

- 有機リン剤・カーバメート剤・合成ピレスロイド剤などに効きにくくなった害虫に有効である。
- 幅広い殺虫スペクトルを有する。
- 高い活性があり，少ない薬量で長い残効性がある。
- 速効性と強い浸透移行性を併せ持つ薬剤である。
- ミツバチ・マルハナバチに影響が少ない。
- 液体タイプの剤型で，計量が簡単にできる。
- 速やかに水に溶けるので，散布液の調製に手間がかからない。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- ばれいしょに対して希釈倍数1000倍で使用する場合は，少量散布に適合したノズルを装着した乗用型の速度連動式地上液剤散布装置を使用する。

【薬効・薬害等の注意】……………

- 少量の水で希釈すると結晶が析出する場合があるので，所定量の水で希釈する。
- てんさいに使用する場合，使用濃度・使用量を守って使用する。（定植初期の幼苗に軽度な薬害）
- 散布量は，対象作物の生育段階，栽培形態及び散布方法に合わせ調節する。
- 共通注意事項8．適用作物群に関する注意事項を参照。

【安全対策上の注意】……………

- 蚕に対して長期間毒性があるので，近くに桑園のある場合は絶対に桑葉にかからないようにする。
- 眼に対して刺激性がある。
- 無人航空機散布の際は，共通注意事項の2．空中散布及び無人航空機（無人ヘリコプター等）による散布・滴下に関する注意事項を参照。



【適用と使用法】……………

作物名	適用害虫名	希釈 倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	アセタミプリドを含 む農薬の総使用回数
かんきつ	アブラムシ類 ミカンハモグリガ コアオハナムグリ ケシキスイ類 アゲハ類 コナジラミ類	4000倍	200～ 700 ℓ	14日前まで	3回以内	散布	3回以内
	アザミウマ類 カイガラムシ類 ゴマダラカミキリ成虫 カメムシ類 ミカンバエ	2000～ 4000倍					
	ゴマダラカミキリ	200～ 400倍	30～ 75 ℓ			主幹から 株元に散布	

作物名	適用害虫名	希釈 倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	アセタミプリドを含 む農薬の総使用回数	
キウイフルーツ	キウイヒメヨコバイ	4000 倍	200 ～ 700 ℓ	7日前まで	3回以内	散布	3回以内	
び わ	アブラムシ類			前日まで				
ばれいしょ	テントウムシダマシ類	2000 ～ 6000 倍	100 ～ 300 ℓ	7日前まで		無人航空機 による散布	4回以内 (植付時の土 壌混和は1回 以内、植付後 は3回以内)	
	ナストビハムシ		25 ℓ					
			64 倍			3.2 ℓ		
とうもろこし (子 実)	アブラムシ類	4000 ～ 6000 倍	100 ～ 300 ℓ	14日前まで		無人航空機 による散布	散布	
				前日まで				
未 成 熟 とうもろこし		64 倍	3.2 ℓ					
豆 類 (種実、但し、 だいず、あずき、 いんげんまめを 除く)		4000 倍	100 ～ 300 ℓ	14日前まで		散布	3回以内	
だ い ず	カメムシ類	2000 ～ 4000 倍						
	マメシンクイガ	4000 倍						
	フタスジヒメハムシ	4000 倍						
あ ず き	ノメイガ類	2000 倍						
	アブラムシ類	2000 ～ 4000 倍						
マメホソクチゾウムシ								
いんげんまめ	アブラムシ類	4000 倍		7日前まで				
やまのいも				21日前まで				
やまのいも (むかご)								
はくさい ブロッコリー	コナガ アオムシ	2000 倍	14日前まで					
キ ャ ベ ツ	アブラムシ類	4000 倍	7日前まで	5回以内				
	コナガ アオムシ	2000 倍						
だい こん	アブラムシ類	4000 倍	14日前まで	1 回				
はつかだいこん								
にん じ ん	アブラムシ類	4000 倍	前日まで	3回以内				
たまねぎ	アザミウマ類	2000 ～ 3000 倍	7日前まで					

作物名	適用害虫名	希釈 倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	アセタミプリドを含 む農薬の総使用回数
ね ぎ	アザミウマ類	2000～ 3000 倍	100～ 300 ℓ	7日前まで	3回以内	散布	3回以内 (は種時の土壌 混和は1回以内、 植付時の土壌混 和及び定植当日 までの株元散布 は合計1回以内)
アスパラガス	カメムシ類	4000 倍		前日まで	2回以内		2回以内
豆 類 (未成熟、但し、 えだまめ、 さやいんげん、 さやえんどう を除く)	アブラムシ類			7日前まで	3回以内		3回以内
え だ ま め	アブラムシ類 カメムシ類 マメシンクイガ フタスジヒメハムシ						4回以内 (は種時又は 定植時の土壌 混和は合計1 回以内、散布 は3回以内)
さやいんげん さやえんどう	アブラムシ類			前日まで	2回以内		3回以内
か ぼ ち ゃ		3回以内 (粒剤の定植時 までの処理は 1回以内、散 布及び定植後 の株元散布は 合計2回以内)					
麦 類	4000～ 6000 倍	60～ 150 ℓ	7日前まで	3日前まで	3回以内	2回以内	
てんさい	ムギキモグリバエ	4000 倍	100～ 300 ℓ			定植前	1 回
	アブラムシ類 テンサイトビハムシ ヨトウムシ カメノコハムシ			200 倍	ペーパー ポット 1冊当り1ℓ (3ℓ/m ²)		
茶	コミカンアブラムシ チャノホソガ ツマグロアオカシカメ マダラカサハラハムシ	4000 倍	200～ 400 ℓ	摘採7日 前まで		散布	1 回