フィプロニル・プロベナゾール粒剤

Dr. オリゼプリンス粒剤 10

取扱メーカー: 北興, Meiji

原体メーカー: BASF, Meiji

成分: フィプロニル [フェニルピラゾール系 PRTR・1種] …1.0% プロベナゾール……………………………24.0%

性状:類白色細粒

毒性:普通物 消防法:——

作物名	適用病害虫名	1箱*当り 使用量	使用時期	使用方法	総使用回数
稲(箱育苗)	いもみ枯病菌病白菜は大きな枯病がウェースを大きな大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのではないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースを大きないのでは、カースをしないのではないのではないのではないのではないのではないのではないのではないのでは	50 g	緑化期~移植3日前~移植当日移植3日前	育苗箱の苗の上か ら均一に散布する。	本剤 1回 フィブロニル 1回 ブロベナゾール 2回以内 (移植時までの処理は1 回以内)
	いもち病 イネドロオイムシ	30 g	移植3日前 ~ 移植当日		

^{*}育苗箱は30×60×3 cm, 使用土壌約5 ℓ