

|   |   |
|---|---|
| <b>ペンチオピラド水和剤</b><br><b>フルーツセイバー</b>    | <b>取扱メーカー：</b><br>北興，三井アグロ，カネショウ<br><br><b>原体メーカー：</b><br>三井アグロ |
| <b>成分：</b> ペンチオピラド〔コハク酸脱水素酵素阻害剤〕……15.0% | <b>性状：</b> 類白色水和性粘稠懸濁液体<br><b>毒性：</b> 普通物<br><b>消防法：</b> ——     |

### 【品目特性】 .....

●幅広い殺菌スペクトラムで定評あるアフエットフロアブルをベースに，処方をイチから見直して果樹に最適な製剤にした果樹専用殺菌剤。

●優れた予防効果を示す。

●ぶどう収穫7日前まで。そのほかの登録果樹では収穫前日まで使える。

●有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

### 【使用上のポイント】 .....

●発病前から発病初期の早めの散布により安定した効果がえられる。

●薬剤耐性菌の出現を防ぐため，本剤の過度の連用はさけ，作用性の異なる薬剤との輪番で使用する。

●作物全体に薬液が十分かかるようにいねいに散布する。

●耕種の防除との併用で効果が安定する。

### 【薬効・薬害等の注意】 .....

●使用前によく振ってから使用する。

●ぶどうの幼果期（小豆大）以降の散布は，果粉が溶脱するおそれがあるので使用をさける。

●共通注意事項8，適用作物群に関する注意事項を参照。

### 【安全対策上の注意】 .....

●眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに水洗する。

【適用と使用法】 .....

| 作物名   | 適用病害名  | 希釈倍数                 | 10 a 当り<br>使用液量 | 使用時期<br>(収穫前)    | 本剤の<br>使用回数 | 使用方法 | ベンチオピラドを含<br>む農薬の総使用回数 |
|-------|--|----------------------|-----------------|------------------|-------------|------|------------------------|
| おうとう  | 灰星病<br>幼果菌核病<br>炭疽病<br>褐色せん孔病                | 1500 倍               | 200 ～<br>700 ℓ  | 前日まで             | 3 回以内       | 散布   | 3 回以内                  |
| なし    | 黒星病<br>赤星病<br>うどんこ病                          | 1500 ～<br>3000 倍     |                 |                  |             |      |                        |
|       | 褐色斑点病  | 2000 倍               |                 |                  |             |      |                        |
| ぶどう   | 灰色かび病<br>黒とう病<br>晩腐病<br>さび病<br>うどんこ病<br>褐斑病  | 1500 倍               |                 |                  |             |      |                        |
|       | 小粒核果類  | 灰星病<br>すす点病(すもも)     |                 | 1500 ～<br>2000 倍 |             |      |                        |
| もも    | 黒星病  |                      |                 |                  |             |      |                        |
|       | ネクタリン  | 黒星病<br>灰星病           |                 |                  |             |      |                        |
| うどんこ病 |  | 2000 倍               |                 |                  |             |      |                        |
| りんご   | 赤星病<br>うどんこ病<br>黒星病<br>モニリア病<br>すす点病<br>すす斑病 | 1500 ～<br>3000 倍     |                 |                  |             |      |                        |
|       | 斑点落葉病<br>黒点病                                 | 1500 ～<br>2000 倍     |                 |                  |             |      |                        |
|       | 褐斑病<br>灰色かび病                                 | 2000 倍               |                 |                  |             |      |                        |
|       | かんきつ   | 黒点病<br>灰色かび病<br>そうか病 |                 | 1500 ～<br>2000 倍 |             |      |                        |
| かき    | うどんこ病<br>灰色かび病<br>落葉病<br>炭疽病                 |                      |                 |                  |             |      |                        |
|       | すす点病   | 2000 倍               |                 |                  |             |      |                        |