

クレソキシムメチル水和剤 ストロビーフロアブル	取扱メーカー： 日産，BASF， 日本曹達 原体メーカー： BASF
成分： クレソキシムメチル〔ストロピルリン系 PRTR・1種〕…44.2%	性状： 類白色水和性粘稠懸濁液体 毒性： 普通物 消防法： —

【品目特性】

- ストロビードライフロアブルの項参照。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】

- 使用に当たっては容器を良く振り，使用量に合わせて薬液を調整し，使いきる。
- 浸透性を高める効果のある展着剤を混用すると薬害が生じることがあるので，展着剤加用に当たっては事前にその適否を確認する。
- 散布液調製の際は，水をかきまぜながら本剤の所定量を徐々に加える。

【薬効・薬害等の注意】

- 過度の連用はさけ，なるべく作用性の異なる薬剤との輪番で使用する。
- 共通注意事項8．適用作物群に関する注意事項を参照。
- 小麦に対して希釈倍数500倍で散布する場合は，少量散布に適合したノズルを装着する。

●適用作物（いちご，メロン，きく，はくさい，食用金魚草）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

●適用外作物（観賞用金魚草）への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

●のざわなに使用する場合には，幼苗期の散布は多湿条件下では薬害が生じるおそれがあるので注意する。

●しゅんぎくを使用する場合には，幼苗期の散布は多湿条件下では薬害が生じるおそれがあるので注意する。

●アスパラガスに使用する場合には，高温多湿条件下では薬害が生じるおそれがあるので使用をさける。展着剤の加用はさける。

【安全対策上の注意】

- 散布器具・容器の洗浄水及び空容器は適切に処理する。



【適用と使用法】

作物名	適用病害名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	クレソキシムメチルを 含む農薬の総使用回数
麦 類 (小麦を除く)	うどんこ病	2000～ 3000倍	60～ 150 ℓ	14日前 まで	3回以内	散布	3回以内
小 麦	赤かび病		500倍				
	赤さび病						
やまのいも	葉渋病	2000～ 3000倍	100～ 300 ℓ	7日前 まで			
やまのいも (むかご)		2000倍					
きゅうり	うどんこ病 べと病 褐斑病 炭疽病	3000倍		前日まで			

作物名	適用病害名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	クレソキシムメチルを 含む農薬の総使用回数
きゅうり (花)	うどんこ病 べと病 褐斑病	3000 倍	100 ～ 300 ℓ	3 日前 まで	2 回以内	散布	2 回以内
すいか	炭疽病 つる枯病 うどんこ病	2000 ～ 3000 倍		前日まで	3 回以内		3 回以内
メロン	べと病 うどんこ病 つる枯病						
かぼちゃ	べと病	3000 倍		7 日前 まで			
にがうり	うどんこ病						
うり類 (漬物用)	うどんこ病 つる枯病 べと病 炭疽病			3 日前 まで			
ズッキーニ	うどんこ病						
なす	うどんこ病 すすかび病			前日まで			
ピーマン	うどんこ病 黒枯病						
とうがらし類 (ししとうを除く)	うどんこ病	4000 倍		2 回以内			
ししとう	うどんこ病 黒枯病						
はくさい	黒斑病 白斑病 べと病	3000 倍		3 日前 まで	3 回以内		3 回以内
たかな たいさい	白斑病			7 日前 まで	2 回以内		2 回以内
なばな	白さび病	3000 ～ 4000 倍					
すいぜんじな	黒斑病	3000 倍		14 日前 まで	3 回以内		3 回以内
タアサイ	白さび病			前日まで			
のぎわな	べと病			14 日前 まで			
サラダ菜	褐斑病			3 日前 まで	2 回以内		2 回以内
おおさきな	黒斑病			前日まで	3 回以内		3 回以内
いちご	うどんこ病			3000 ～ 5000 倍			
にら (花茎)	さび病 白斑葉枯病	3000 倍		7 日前 まで	3 回以内		3 回以内
ねぎ	黒斑病 さび病 黄斑病	2000 倍					
わけぎ	灰色かび病	3000 倍		21 日前 まで	2 回以内		2 回以内

作物名	適用病害名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	クレソキシムメチルを 含む農薬の総使用回数			
たまねぎ	灰色かび病	2000～ 3000倍	100～ 300 ℓ	14日前 まで	3回以内	散布	3回以内			
	灰色腐敗病	2000倍		7日前 まで						
にんにく	さび病			14日前 まで						
葉にんにく										
らっきょう	乾腐病	200倍	－	植付前	1回	30分間 種球浸漬	1回			
にんじん	黒葉枯病	2000～ 3000倍	100～ 300 ℓ	7日前 まで	3回以内	散布	3回以内			
	斑点病	3000倍		21日前 まで						
てんさい	葉腐病	2000倍			75日前 まで		2回以内	2回以内		
	褐斑病	2000～ 3000倍								
たらのぎ	そうか病	2000倍	100～ 500 ℓ	前日まで	3回以内		3回以内			
アスパラガス	斑点病			7日前 まで						
食用ゆり	葉枯病		100～ 300 ℓ	14日前 まで	1回		1回			
パセリ	うどんこ病	3000倍		7日前 まで	2回以内		2回以内			
しゅんぎく	炭疽病							4000倍	3回以内	3回以内
しそ科葉菜類 (しそを除く)	灰色かび病									
しそ	斑点病	3000倍		前日まで	3回以内		3回以内			
	灰色かび病							3日前 まで	2回以内	2回以内
セルリー	斑点病	3000倍		前日まで	2回以内		2回以内			
チャービル ディル(葉)	うどんこ病							3000倍	前日まで	2回以内
さやえんどう 実えんどう	さび病	2000倍		2000～ 3000倍	3回以内		3回以内			
茶	もち病		2000～ 3000倍			200～ 400 ℓ		摘採10日 前まで	3回以内	3回以内
	網もち病 炭疽病 輪斑病 新梢枯死症									
食用金魚草	さび病	3000倍	100～ 300 ℓ	7日前 まで	2回以内	2回以内				
食用トレニア	うどんこ病	4000倍		3日前 まで						
食用パンジー				7日前 まで						
食用西洋たんぽぽ		3000倍		45日前 まで						
食用かえで (葉)				3日前 まで						
食用ぎく	白さび病	2000～ 3000倍		7日前 まで	3回以内	3回以内				
きく(葉)	黒斑病 褐斑病									
きく		2000～ 3000倍		発病初期	3回以内	3回以内				
アスター	さび病									
りんどう	黒斑病 褐斑病	2000倍	100～ 700 ℓ							