

<b>プロメトリン・S-メトラクロール水和剤</b> <b>コダール S 水和剤</b>	<b>取扱メーカー：</b> 北興、日本化薬  <b>原体メーカー：</b> シンジェンタ、シンジェンタ
<b>成分：</b> プロメトリン〔トリアジン系〕……………26.6% S-メトラクロール〔酸アミド系 PRTR・1種〕……………24.8%	<b>性状：</b> 類白色水和性粉末45 $\mu$ m以下 <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> ——

### 【品目特性】……………

- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

### 【使用上のポイント】……………

- 作物の出芽前（地割れが起きる前まで）、雑草の発生前に散布する。

### 【薬効・薬害等の注意】……………

- 砕土、整地及び覆土は丁寧にいう。
- 土壌が極端に乾燥している場合、所定量の範囲内で散布水量を多めにし、丁寧に散布する。
- 有機物の多い土壌や粘土質の土壌では所定範囲内で多めの薬量を散布する。
- 極端な過湿土壌及び砂質土壌で使用する場合、少なめの薬量を散布する。

- 砂土では使用しない。
- にんじんのトンネル栽培では使用をさける（薬害）。
- 適用作物（適用作物、さやいんげん、いんげんまめ、にんじん）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。
- 適用外作物（周辺作物）への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。
- 当年又は翌年の水稲栽培をさける。

### 【安全対策上の注意】……………

- 周辺の桑葉にはかからないようにする（蚕毒）。
- 藻類に影響を及ぼすおそれがあるので使用時は注意。



【適用と使用法】 .....

作物名	適用 雑草名	適用 土壌	使用時期	10 a 当り使用量		本剤の 使用回数	使用 方法	適用 地帯	プロメトリンを含む 農薬の総使用回数	メトラクロール及び S-メトラクロールを 含む農薬の総使用回数						
				薬量	希釈水量											
たまねぎ	一年生 雑草	全土壌 (砂土を 除く)	定植活着 15 日 後まで（雑草 発生前）又は 中耕除草後、 但し、収穫 90 日前まで （雑草発生前）	150～ 225g	70 ～ 100 ℓ	1 回	全面 土壌 散布	北海道	1 回	1 回						
だ い ず え だ ま め い ん げ ん ま め さ や い ん げ ん べ に ば い ん げ ん			は種後出芽前 （雑草発生前）								全域					
やまのいも			植付後萌芽前 （雑草発生前）	225～ 300g	100 ℓ		畦間 土壌 散布									
			萌芽後 但し、植付 45 日後まで （イネ科雑草 2 葉期まで）													
に ん じ ん			は種後出芽前 （雑草発生前）				150g	70 ～ 100 ℓ			全面 土壌 散布		2 回以内			
とうもろこし 飼料用とうもろこし							225～ 300g						1 回			