

クミルロン・ペントキサゾン剤 草笛ジャンボ	取扱メーカー： 協友アグリ，科研製薬，丸紅アグロ 原体メーカー： 丸紅アグロ，科研製薬
成分： クミルロン〔尿素系 PRTR・1種〕……………15.0% ペントキサゾン〔オキサゾリジンジオン系〕……………4.5%	性状： 類白色錠形 毒性： 普通物 消防法： —

【品目特性】……………

- 水田一年生雑草やカヤツリグサ科に有効な水稲用初期除草剤である。
- 問題のアメリカアゼナ，ミズアオイなどの一年生広葉雑草にも高い効果を示す。
- 水稲に対する安全性が高く，移植前及び移植直後から移植後に使用できる。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。
- 本剤には二酸化炭素を発生する発泡組成物が含まれているため，水田に投入後速やかに発泡が始まり，その発泡力で圃場全体に均一に拡散する。

【使用上のポイント】……………

- 共通注意事項の5．水稲除草剤散布 使用上のポイントを参照。
- 開封後は速やかに使いきる。
- 雑草の発生前から発生始期が本剤の散布適期である。
- 移植前に散布する場合は，散布後7日以上の間隔をあけて苗を移植する。
- クログワイ，コウキヤガラ防除は，有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

雑草名	散布適期	
	5個/10a	10個及び20個/10a
ホタルイ	発生前～発生始期まで	
ミズガヤツリ	発生前	発生前～ 発生始期まで
ヘラオモダカ	—	
クログワイ コウキヤガラ		発生前

【薬効・薬害等の注意】……………

- 適用作物（水稲）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。
- 適用外作物（れんこん，くわい，せり）への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

【安全対策上の注意】……………

- 魚類に影響を及ぼすので，養魚田では使用しない。
- 藻類に影響を及ぼすので，使用时並びに使用後も注意。

【適用と使用方法】

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ヘラオモダカ	植代後～移植前 7 日又は 移植直後～ノビエ 1 葉期 但し、 移植後 30 日まで	20 個 (1 kg)	水田に投げ 入れる。	1 回 ※
	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ヘラオモダカ クログワイ コウキヤガラ		10 個 (500 g)		
	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ		5 個 (250 g)		

※クミルロンを含む農薬の総使用回数 ： 2 回以内
 ※ペントキサゾンを含む農薬の総使用回数： 2 回以内