

<b>クロチアニジン粉剤</b> <b>ダントツH粉剤 DL</b>	<b>取扱メーカー：</b> 協友アグリ，サンケイ*，住友化学  <b>原体メーカー：</b> 住友化学
<b>成分：</b> クロチアニジン〔ネオニコチノイド系〕……………0.5%	<b>性状：</b> 類白色粉末45μm以下， 浮遊性指数20以下  <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> ——

### 【品目特性】……………

- ダントツ粉剤 DL の高含量品で，特にカメムシ類への効力の増強，残効性を重視した薬剤である。
- カメムシ類の防除回数削減に貢献できる薬剤である。
- ダントツ粉剤 DL の項参照。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

### 【使用上のポイント】……………

- カメムシ類を対象に使用する場合は，カメムシの発生状況に合わせて散布する。

### 【安全対策上の注意】……………

- 眼に入らないように注意。眼に入った場合は直ちに水洗する（弱い刺激性）。
- 共通注意事項7．ミツバチに対する注意事項を参照。
- マルハナバチに影響を及ぼすおそれがあるので注意する。



### 【適用と使用法】……………

作物名	適用場所	適用害虫名	10 a 当り 使用量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	クロチアニジンを含 む農薬の総使用回数
稲	—	カメムシ類 ウンカ類 ツマグロヨコバイ イナゴ類 イネツトムシ ニカメイチュウ フタオビコヤガ	3～4 kg	7 日前まで	3 回以内	散布	4 回以内 (直播では種 時又は移植時ま での処理は1回 以内、本田での 散布、空中散布、 無人航空機散布 は合計3回以内)
		イネドロオイムシ	3 kg				
だ い ず		マメシクイガ ウコンノメイガ	4 kg				4 回以内 (は種時の土壌 混和は1回以 内、散布は 3回以内)
		アブラムシ類 カメムシ類 フタスジヒメハムシ					
水田作物、 畑作物 (休耕田)	ヨシ、オギ、ス スキ、セイタカ アワダチソウ 等の多年生雑 草が優占して いる休耕田	カメムシ類	3～4 kg	—	4 回以内		4 回以内