

クロチアニジン・イソチアニル粒剤 スタウトダントツ箱粒剤	取扱メーカー： 協友アグリ、サンケイ*、住友化学 原体メーカー： 住友化学、住友化学・バイエル
成分： クロチアニジン〔ネオニコチノイド系〕……………1.5% イソチアニル〔チアジアゾールカルボキサミド系〕…2.0%	性状： 類白色細粒 毒性： 普通物 消防法： ——

【適用と使用方法】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	使用方法	総使用回数
稲 (箱育苗)	苗腐敗症 (もみ枯細菌病菌) 苗立枯細菌病 いもち病 白葉枯病 もみ枯細菌病 穂枯れ (ごま葉枯病菌) 内穎褐変病 イネミズゾウムシ イネドロオイムシ ウンカ類 ツマグロヨコバイ フタオビコヤガ ニカメイチュウ イネヒメハモグリバエ	育苗箱* 1箱当り 50g	は種前	育苗箱の 床土又は 覆土に均 一に混和 する。	本剤 1回 クロチアニジン 4回以内 (移植時までの処理は1回以内、 本田での散布、空中散布、無 人航空機散布は合計3回以内) イソチアニル 3回以内 (移植時までの処理は1回以内、 本田では2回以内)
	いもち病 白葉枯病 もみ枯細菌病 穂枯れ (ごま葉枯病菌) 内穎褐変病 イネミズゾウムシ イネドロオイムシ ウンカ類 ツマグロヨコバイ フタオビコヤガ ニカメイチュウ イネヒメハモグリバエ		は種時 (覆土前) ～移植当日	育苗箱の 上から均 一に散布 する。	
	苗腐敗症 (もみ枯細菌病菌) 苗立枯細菌病		は種時 (覆土前)		

* 育苗箱は 30×60×3cm、使用土壌約 5ℓ

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	使用方法	総使用回数
稲	いもち病 イネミズゾウムシ	1kg/10a	移植時	側条施用	本剤 1回 クロチアニジン 4回以内 (直播での種時又は移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) イソチアニル 3回以内 (直播での種時又は移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内)
湛水直播 水稻	いもち病 イネミズゾウムシ イネドロオイムシ		は種時	は種同時 施薬機を用いて土 中施用する。	本剤 1回 クロチアニジン 4回以内 (は種時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) イソチアニル 3回以内 (は種時までの処理は1回以内、本田では2回以内)