

オキサジクロメホン・テフリトリオン・プロモブチド剤 ビンワン (1キロ粒剤 / ジャンボ / フロアブル)	取扱メーカー： 北興 原体メーカー： 全農、全農・バイエル・北興、 住友化学
成分： オキサジクロメホン〔オキサジノン系 PRTR・1種〕 ……………0.80% (粒剤), 1.2% (ジャンボ), 1.1% (フロアブル) テフリトリオン〔トリケトン系〕 ……………3.0% (粒剤), 6.0% (ジャンボ), 5.5% (フロアブル) プロモブチド〔酸アミド系〕 ……………9.0% (粒剤), 18.0% (ジャンボ), 16.5% (フロアブル) その他 PRTR 該当成分： ドデシル硫酸ナトリウム (PRTR・1種) ……1.4% (ジャンボ)	性状： 類白色細粒 (粒剤) 類白色細粒 水溶性パック入り 1パック50g (ジャンボ) 類白色水和性粘稠懸濁液体 (フロアブル) 毒性： 普通物 消滅法： ——

【品目特性】…………… 〈共通〉

- スルホニルウレア抵抗性のホタルイ、オモダカに対して高い効果を示す。
- クサネム、イボクサ等の難防除雑草に対して効果が優れる。
- ノビエに長期残効を示す有効成分の働きにより、ノビエに対し安定した効果を発揮する。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】…………… 〈共通〉

- 共通注意事項5. 水稲除草剤散布 使用上のポイントを参照。
- 雑草の発生前から発生初期に有効なので、ノビエの2.5葉期までに散布する。
- 多年生雑草は生育段階によって効果にフレがあるので、必ず適期に散布する。

雑草名	散布適期		
	粒剤	ジャンボ	フロアブル
ホタルイ	2葉期まで		
ウリカワ	1葉期まで	2葉期まで	
ヘラオモダカ	3葉期まで		
ミズガヤツリ	3葉期まで		
ヒルムシロ	発生期まで		
セリ	再生始期まで		
オモダカ クログワイ	発生始期まで		

- オモダカ、クログワイは発生期間が長く、遅い発生のものまでは十分な効果を示さない場合があるので、必要に応じて有効な前処理剤又は後処理剤と組み合わせて使用する。

〈ジャンボ〉

- 小包装 (パック) のまま10 a 当り10個の割合で水田に施用する。
- 投げ入れ処理の場合は、水深を5～6cmにする。
- 水口施用の場合は、水口付近の水深を2～3cm程度に湛水した状態で、入水時に小包装 (パック) のまま水口に施用し、流入水とともに水田全面に拡散させる。施用後田面水が通常の湛水状態 (湛水深5～6cm) に達した時に必ず水を止め、田面水があふれないように注意する。

〈フロアブル〉

- 水口施用の場合は、入水時に水口に施用し、流入水とともに水田全面に拡散させる。処理後田面水が通常の湛水状態 (湛水深3～5cm) に達した時に必ず水を止め、田面水があふれないように注意する。

【薬効・薬害等の注意】…………… 〈共通〉

- 共通注意事項5. 水稲除草剤散布 薬効・薬害等の注意を参照。
- 適用作物 (水稲) 及び適用外作物 (いぐさ、れんこん、せり、くわい等) への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

【安全対策上の注意】…………… 〈粒剤〉

- 周辺の桑葉にはかからないようにする (蚕毒)。
- 無人ヘリコプター散布の際は、共通注意事項の2. 空中散布及び無人航空機 (無人ヘリコプター等) による散布・滴下に関する注意事項を参照。

〈ジャンボ〉

- 水溶性フィルムが破袋した場合は、誤食したり眼に入らないよう注意。

〈フロアブル〉

- 周辺の桑葉にはかからないようにする（蚕毒）。
- 無人航空機滴下の際は、共通注意事項の2. 空中散布及び無人航空機（無人ヘリコプター等）による散布・滴下に関する注意事項を参照。

〈粒剤・フロアブル〉



【適用と使用法】.....

①ビンワン 1 キロ粒剤

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ヘラオモダカ ミズガヤツリ ヒルムシロ セリ クログワイ オモダカ	移植後5日～ ノビエ2.5葉期 但し、 移植後30日まで	1kg	湛水散布 又は 無人ヘリコプター による散布	1回 ※

※オキサジクロメホンを含む農薬の総使用回数：2回以内
 ※テフリルトリオンを含む農薬の総使用回数：2回以内
 ※プロモブチドを含む農薬の総使用回数：2回以内

②ビンワンジャンボ

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稻	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ヘラオモダカ ミズガヤツリ ヒルムシロ セリ クログワイ オモダカ	移植後5日～ ノビエ2.5葉期 但し、 移植後30日まで	小包装 (パック) 10個 (500g)	水口施用 又は 水田に小包装 (パック) のまま 投げ入れる。	1回 ※

※オキサジクロメホンを含む農薬の総使用回数：2回以内
 ※テフリルトリオンを含む農薬の総使用回数：2回以内
 ※プロモブチドを含む農薬の総使用回数：2回以内

③ビンワンフロアブル

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ セリ オモダカ クログワイ	移植後5日～ ノビエ2.5葉期 但し、 移植後30日まで	500 ml	原液湛水散布， 水口施用 又は 無人航空機による 滴下	1回 ※

※オキサジクロメホンを含む農薬の総使用回数：2回以内

※テフリルトリオンを含む農薬の総使用回数：2回以内

※プロモブチドを含む農薬の総使用回数：2回以内