

チアメトキサム・ピロキロン粒剤 デジタルコラトップアクタラ箱粒剤	取扱メーカー： 協友アグリ 原体メーカー： シンジェンタ，シンジェンタ
成分： チアメトキサム〔ネオニコチノイド系〕……………2.0% ピロキロン……………12.0% その他 PRTR 該当成分： ポリ(オキシエチレン)アルキルエーテル〔PRTR・1 種〕……………1.6%	性状： 褐色細粒 毒性： 普通物 消防法： ——

【適用と使用方法】

作物名	適用病害虫名	1 箱*当り 使用量	使用時期	使用方法	総使用回数
稲 (箱育苗)	いもち病 ウンカ類 ツマグロヨコバイ イネミズゾウムシ イネドロオイムシ	50 g	移植前 3 日 ～移植当日	育苗箱中の苗 の上から均一 に散布する。	本剤 1 回 チアメトキサム 3 回以内 (移植時までの処理は 1 回以 内，本田では 2 回以内) ピロキロン 3 回以内 (移植時までの処理は 1 回以 内，本田では 2 回以内)
	イネクロカメムシ ニカメイチュウ		移植当日		
稲	いもち病 イネミズゾウムシ イネドロオイムシ	1kg/10a	移植時	側条施用	本剤 1 回 チアメトキサム 3 回以内 (直播では種時又は移植時 までの処理は 1 回以内，本 田では 2 回以内) ピロキロン 3 回以内 (直播では種時又は移植時 までの処理は 1 回以内，本 田では 2 回以内)

* 育苗箱は 30×60×3 cm，使用土壌約 5 ℓ