

プロベナゾール粒剤 オリゼメート1キロ粒剤	取扱メーカー： 北興, Meiji* 原体メーカー： Meiji
成分： プロベナゾール……………24.0%	性状： 類白色細粒 毒性： 普通物 消防法： ——

【品目特性】……………

- いもち病，白葉枯病に効果の高いオリゼメートの1キロ粒剤。
- 10 a 当り 1 kg（1袋）散布で省力的である。
- その他，オリゼメート粒剤の項参照。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【薬効・薬害等の注意】……………

- 予防的に散布した場合に有効である。葉いもち防除の使用適期は，初発の7～10日前であるので，発生予察情報に注意して時期を失しないように散布する。穂いもち防除の使用適期は，出穂の3～4週間前である。
- 湛水状態（湛水深3～5 cm）でまきムラのない

ように散布し，散布後少なくとも4～5日間は湛水状態を保ち，田面を露出させたり，水をきらしたりしないように注意し，また，散布後7日間は落水，かけ流しはしない。

- その他オリゼメート粒剤の項参照。
- 適用作物（稲）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

【安全対策上の注意】……………

- 夏期高温時の使用をさける。
- 作業時に着用していた衣服等は，他のものと分けて洗濯する。
- 魚類に影響を及ぼすので，使用时並びに使用後も注意。



【適用と使用方法】……………

作物名	適用病害名	10 a 当り 使用量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	プロベナゾールを含む 農薬の総使用回数
稲	いもち病 もみ枯細菌病 白葉枯病	1～1.3 kg	14日前まで	2回以内	散布	2回以内 (移植時までの処理は 1回以内)