

# ジマンダイセン水和剤

成分：マンゼブ〔有機硫黄系 PRTR・1 種〕……80.0%

毒性：普通物

## 【適用と使用法】

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	マンゼブを含む農 薬の総使用回数
ぶ ど う	晩腐病 褐斑病 さび病 べと病 黒とう病	1000 倍	200～ 700 ℓ	45 日前 まで	2 回以内	散布	2 回以内
り ん ご	斑点落葉病 赤星病 黒星病 黒点病 モニリア病 すす点病 すす斑病	500～ 600 倍		30 日前 まで	3 回以内		3 回以内
	輪紋病	500 倍					
	褐斑病 炭疽病	600 倍					
	な し	赤星病 黒星病 黒斑病 輪紋病			400～ 600 倍		5 回以内
も も	黒星病 果実赤点病 すすかび病	600 倍		21 日前 まで	3 回以内		3 回以内
か き	炭疽病 落葉病 黒星病	400～ 800 倍		45 日前 まで	2 回以内		2 回以内
		400 倍					
み か ん	黒点病	400～ 800 倍		30 日前 まで	4 回以内		4 回以内
	黄斑病 小黒点病	600～ 800 倍					
	ミカンサビダニ	1000 倍					
	そうか病	400 倍					
	褐色腐敗病 そばかす病 赤衣病 炭疽病（さび果） チャノキイロアザミウマ	400～ 600 倍					
	黒点病	5 倍	4 ℓ			無人航空機 による散布	
お う と う	灰星病 炭疽病	600 倍	200～ 700 ℓ	21 日前 まで	2 回以内	散布	2 回以内

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	マンゼブを含む農 薬の総使用回数
か ん き つ (みかんを除く)	黒点病 黄斑病 小黒点病	600～ 800 倍	200～ 700 ℓ	90 日前 まで	4 回以内	散布	4 回以内
	ミカンサビダニ	1000 倍					
	褐色腐敗病 そばかす病 赤衣病 炭疽病(さび果) 汚れ果症 幹腐病 チャノキイロアザミウマ	600 倍					
	黒点病	5 倍	4 ℓ		無人航空機 による散布		
	く り	実炭疽病	600 倍	200～ 700 ℓ	7 日前 まで	2 回以内	2 回以内
	び わ	たてぼや病			落弁期 まで		
	マ ン ゴ ー	炭疽病	800 倍		45 日前 まで		
あけび(果実)	そうか病 斑点細菌病	500 倍	60 日前 まで				
す い か	炭疽病 べと病 つる枯病 疫病 褐斑細菌病	400～ 600 倍	100～ 300 ℓ	7 日前 まで	7 回以内	7 回以内	
メ ロ ン	炭疽病 べと病 つる枯病 疫病 斑点細菌病				5 回以内	5 回以内	
か ぼ ち や	炭疽病 べと病 つる枯病 疫病	600 倍		21 日前 まで	2 回以内	散布	2 回以内
は く さい	べと病 白斑病 黒斑病			30 日前 まで	1 回	1 回	
キ ャ ベ ツ	べと病	3 回以内			3 回以内		
た ま ね ぎ	べと病 さび病 黒斑病 灰色腐敗病 灰色かび病	400～ 600 倍		3 日前 まで	5 回以内	散布	5 回以内
	白色疫病	400～ 500 倍					
ね ぎ	べと病 さび病 黒斑病	600 倍		14 日前 まで	3 回以内		3 回以内
ト マ ト	疫病 葉かび病 輪紋病	800 倍		前日まで	2 回以内		2 回以内

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	マンゼブを含む農 薬の総使用回数		
きゅうり	炭疽病 褐斑病 疫病 黒星病 つる枯病 斑点細菌病	600 倍	100～ 300 ℓ	前日まで	3 回以内	散布	3 回以内		
	べと病	600～ 800 倍		収穫終了後 但し、 秋期まで	6 回以内		6 回以内		
アスパラガス (露地栽培)	斑点病 茎枯病 褐斑病	500 倍 400～ 600 倍			7 日前 まで		10 回以内	無人航空機 による散布	10 回以内 (無人航空機 散布は3回 以内)
ばれいしょ	夏疫病	100 倍		25 ℓ			3 回以内		3 回以内
	疫病	8 倍	3.2 ℓ	3 回以内	3 回以内				
らっかせい	そうか病 褐斑病	400～ 600 倍	100～ 300 ℓ	14 日前 まで	4 回以内	散布	3 回以内		
いんげんめ	炭疽病	600 倍		30 日前 まで	4 回以内		4 回以内		
そらめめ 未成熟そらめめ	さび病 輪紋病	400～ 600 倍			3 回以内		3 回以内	3 回以内	
あずき	茎疫病 さび病	400 倍		45 日前 まで					4 回以内
	べと病	400～ 600 倍			7 日前 まで		5 回以内	5 回以内	
だいず	紫斑病	400～ 600 倍		21 日前 まで					4 回以内
やまのいも	葉渋病 炭疽病	400～ 500 倍			7 日前 まで		3 回以内	3 回以内	
にんにく	白斑葉枯病	400 倍		仮植栽培期 但し、 76 日前まで					6 回以内
にんじん	黒葉枯病	400～ 600 倍			21 日前 まで		5 回以内	5 回以内	
いちご	じゃのめ病 炭疽病	600 倍	発病初期	8 回以内		8 回以内			
てんさい	褐斑病	8 倍			1.6 ℓ		5 回以内	無人航空機 による散布	5 回以内
		125 倍 400～ 600 倍	25 ℓ	100～ 300 ℓ	1 回	1 回			
トルコギキョウ	炭疽病	400 倍	100～ 300 ℓ				――	8 回以内	散布
ばら きく カーネーション	黒星病 さび病 べと病 炭疽病 灰色かび病	400～ 600 倍		1 回	1 回				
	斑入りアマドコロ	褐色斑点病 斑点病				400 倍			
シクラメン	炭疽病	500 倍		1 回	1 回				

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	マンゼブを含む農 薬の総使用回数
ベンジャミン	斑点細菌病	400 倍	200～ 700 ℓ	――	8 回以内	散布	8 回以内
す            ぎ	赤枯病	400～ 600 倍			2 回以内		2 回以内

[取扱メーカー]    ダウ