

ジノテフラン粒剤 スタークル箱粒剤	取扱メーカー： サンケイ＊、三井アグロ 原体メーカー： 三井アグロ
成分： ジノテフラン〔ネオニコチノイド系〕……………2.0%	性状： 類白色細粒 毒性： 普通物 消防法： ——

【品目特性】……………

●水稲のウンカ類・ツマグロヨコバイ・イネドロ
オイムシ・イネミズゾウムシ・ニカメイチュウ・
フタオビコヤガ・イネクロカメムシに高い効果を
示す。

●は種時覆土前から移植当日まで処理時期が選べ
る。また、は種前の床土又は覆土への混和でも使
えるため、さまざまな処理時期、使用方法に対応
できる薬剤である。

●人畜・魚類・鳥類に毒性が低い薬剤である。

●有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一
覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

●所定量を育苗箱の上から均一に散布し、葉に付
着した薬剤を払い落とし、軽く散水してから田植
機にかけて移植する。

●水面に浮きやすいので、処理した育苗箱を移植
前に田面水中に浸さない。

●床土又は覆土に混和処理する場合、処理後速や
かに使用する。また本剤を処理した床土又は覆土
を放置しない。

【薬効・薬害等の注意】……………

●過剰に使用すると葉先枯れなどの薬害を生じる
こともあるので、所定の使用量、使用方法を厳守
する。

●甲殻類に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に
流入しないよう水管理に注意する。

【適用と使用法】……………

作物名	適用害虫名	1箱*当り 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ジノテフランを含む 農薬の総使用回数
稲 (箱育苗)	ウンカ類 ツマグロヨコバイ イネミズゾウムシ イネドロオウムシ イネクロカメムシ	50 g	は種前	1 回	育苗箱の床 土又は覆土 に均一に混 和する。	4 回以内 (育苗箱への 処理及び側条 施用は合計 1 回以内、本田 での散布、空 中散布、無人 ヘリ散布は合 計 3 回以内)
	は種時覆土前 ～移植当日		育苗箱の上 から均一に 散布する。			
	移植 3 日前 ～移植当日					

＊育苗箱は30×60×3cm、使用土壌約5ℓ