

# オークスフロアブル

成分：カフェンストロール〔酸アミド系 PRTR・1種〕 ……5.0%

ダイムロン〔尿素系〕 ……10.0%

ハロスルフロンメチル〔スルホニルウレア系 PRTR・1種〕 ……1.2%

ベンゾビシクロン〔ビシクロオクタン系〕 ……4.0%

毒性：普通物

## 【適用と使用法】 .....

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稻	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヘラオモダカ ヒルムシロ シズイ セリ オモダカ クログワイ アオミドロ・藻類に よる表層はく離	移植後 5 日～ ノビエ 2.5 葉期 但し、 移植後 30 日まで	500 ml	原液湛水散布 又は 無人航空機による 滴下	1 回 ※

※カフェンストロールを含む農薬の総使用回数 : 1 回

※ダイムロンを含む農薬の総使用回数 : 3 回以内(育苗箱散布は 1 回以内, 本田では 2 回以内)

※ハロスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数 : 2 回以内

※ベンゾビシクロンを含む農薬の総使用回数 : 3 回以内

〔取扱メーカー〕 日産