

フィプロニル粒剤 プリンズベイト	取扱メーカー： サンケイ*，BASF，琉産 原体メーカー： BASF
成分： フィプロニル〔フェニルピラゾール系〕……………0.5%	性状： 淡青色粒状 毒性： 普通物 消防法： ——

【品目特性】……………

- ユニークなベイト製剤でハリガネムシ類を誘引して殺虫。
- 有効成分は根から吸収され効果を発揮する。
- さとうきびの植付時処理によりハリガネムシ類及びメイチュウ類の同時防除ができる。
- 培土時処理によりハリガネムシ類，メイチュウ類，アオドウガネ防除ができる。
- かんしょの植え付時処理でハリガネムシ類，コガネムシ類，ゾウムシ類を防除。
- 青色のベイト剤で散布状況がわかりやすい。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- 本剤の所定量を均一に植え溝に処理し土壌混和する。

【薬効・薬害等の注意事項】……………

- 使用量にあわせ秤量し使いきる。
- 使用に当っては使用量，使用時期，使用方法を誤らないよう注意し，特に初めて使用する場合には病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 植付時に使用する場合は，本剤の所定量を均一に植溝へ処理し，土壌混和する。
- 培土時に使用する場合は，本剤の所定量を均一に株元へ処理し，土壌混和する。

【安全対策上の注意事項】……………

- 魚類，甲殻類に影響を及ぼすので，使用時並びに使用後も注意。
- カブレやすい体質の人は取扱いに十分注意する。
- 散布器具・容器の洗浄水及び空容器，空袋等は適切に処理する。



【適用と使用方法】

作物名	適用害虫名	10 a 当り 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	フィプロニルを含む 農薬の総使用回数
さとうきび	ハリガネムシ類	6～9kg	植付時	1 回	植溝処理 土壌混和	1 回
		6kg	培土時		株元処理 土壌混和	
	メイチュウ類	4～6kg	植付時		植溝処理 土壌混和	
	モロコシネグサレセンチュウ	9kg				
	アオドウガネ幼虫 メイチュウ類 シロスジオサゾウムシ	6 kg	培土時		株元処理 土壌混和	
	イエシロアリ ヤマトシロアリ		植付時		植溝処理 土壌混和	
	アリモドキゾウムシ イモゾウムシ コガネムシ類 ハリガネムシ類					
かんしょ	コガネムシ類	全面処理 土壌混和				