

<b>エトフェンブロックス・バリダマイシン・フェリムゾン・フサライド水和剤</b> <b>ブラシントレバリダ水和剤</b>	<b>取扱メーカー：</b> 協友アグリ，サンケイ*，住友化学 <b>原体メーカー：</b> 三井アグロ，住友化学，住友化学， 住友化学
<b>成分：</b> エトフェンブロックス〔ピレスロイド系 PRTR・1種〕… 5.0% バリダマイシン A〔抗生物質〕…………… 2.5% フェリムゾン〔PRTR・1種〕……………15.0% フサライド〔有機塩素系 PRTR・1種〕……………10.0% <b>その他 PRTR 該当成分：</b> ポリ（オキシエチレン）＝ノニルフェニルエーテル〔PRTR・1種〕…3.5%以下	<b>性状：</b> 類白色水和性粉末63μm以下 <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> ——

### 【適用と使用法】 .....

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	使用 方法	総使用回数
稲	いもち病 紋枯病 ごま葉枯病 穂枯れ(ごま葉枯病菌) ツマグロヨコバイ ウンカ類 カメムシ類	500 倍	60～ 150 ℓ	14 日前 まで	散布	本剤 2 回以内 エトフェンブロックス 3 回以内 バリダマイシン 6 回以内 (育苗箱灌注は 1 回以内，本田 では 5 回以内) フェリムゾン 2 回以内 フサライド 3 回以内