

オキシポコナゾールフマル酸塩水和剤 オーシャインフロアブル	取扱メーカー： O A T 原体メーカー： O A T
成分：オキシポコナゾールフマル酸塩〔アゾール系〕…20.0%	性状：類白色水和性粘稠懸濁液体 毒性：普通物 消防法：——

【品目特性】

- オーシャイン水和剤の項参照。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】

- 発病前～発病初期に病勢に応じて作物に全面散布する。

【薬効・薬害等の注意】

- ぶどうで使用する場合、無袋栽培では果実肥大中期（だいず大）以降、有袋栽培では果実肥大中期（だいず大）から袋かけ前までの散布は、果粉の溶脱が生じることがあるので注意する。
- 周辺の作物にかかると薬害を生じるおそれがあるので、かからないように十分注意して散布する。

【安全対策上の注意】

- 眼に入らないように注意（眼刺激）。

【適用と使用法】

作物名	適用病害名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	オキシポコナゾールフマル酸 塩を含む農薬の総使用回数
りんご	赤星病 黒星病 モニリア病 うどんこ病	3000 倍	200～ 700 ℓ	7日前まで	5 回以内	散布	5 回以内
かんきつ (みかんを除く) みかん	灰色かび病 そうか病	2000 倍					
おうとう	灰星病 幼果菌核病 褐色せん孔病	3000 倍		前日まで	3 回以内		
小粒核果類 (うめを除く)	灰星病						
うめ	黒星病	2000～ 3000 倍					
	すす斑病	2000 倍					
	灰星病	3000 倍					
もも ネクタリン	黒星病 灰星病	2000～ 3000 倍		7日前まで	2 回以内		2 回以内
	ホモブシス腐敗病						
ぶどう	うどんこ病 灰色かび病 黒とう病 褐斑病	2000 倍		前日まで	5 回以内		5 回以内