

ジメタメトリン・ピリブチカルブ・プレチラクロール水和剤 農将軍フロアブル	取扱メーカー： 協友アグリ 原体メーカー： 日産、日本曹達、シンジェンタ
成分： ジメタメトリン〔トリアジン系〕……………0.50% ピリブチカルブ〔カーバメート系 PRTR・1種〕……………10.0% プレチラクロール〔酸アミド系 PRTR・1種〕……………5.0%	性状： 類白色水和性粘稠懸濁液体 毒性： 普通物 消防法： —

【品目特性】……………

- 3成分の配合によりノビエなどの水田一年生雑草から多年生雑草及び広葉雑草や藻類まで幅広い水田雑草に優れた効果を発揮する。
- 容器から直接散布ができ、処理が簡便。散布時間が短く、省力的。
- 拡散性に優れ、多少の散布ムラがあっても安定した効果を示す。
- フロアブルなので多少の雨でも処理ができ、適期防除が可能。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- 共通注意事項の5. 水稲除草剤散布 使用上のポイントを参照。
- 雑草の発生前から発生始期に有効なのでノビエの1.5葉期まで（少量散布は、ノビエ1葉期）に使用する。
- 多年生雑草は生育段階によって効果にフレがあるので、必ず適期に散布する。

雑草名	散布適期
ホタルイ ヘラオモダカ	発生始期まで
アオミドロ・藻類による表層はく離	発生前

【薬効・薬害等の注意】……………

- 共通注意事項の5. 水稲除草剤散布 薬効・薬害等の注意を参照。
- 適用作物（水稲）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

【安全対策上の注意】……………

- 空中散布及び無人航空機（無人ヘリコプター等）による散布の際は、共通注意事項2. 空中散布及び無人航空機（無人ヘリコプター等）による散布・滴下に関する注意事項を参照。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。
- 魚類に影響を及ぼすので、養魚田では使用しない。
- 藻類に影響を及ぼすので、使用时並びに使用後も注意。



【適用と使用法】

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ アオミドロ・藻類による 表層はく離	移植時	500 <i>ml</i>	田植同時散布機で施用	1 回 ※
		植代後～移植 7 日前又は 移植直後～ノビエ 1.5 葉期 但し、移植後 30 日まで		原液 湛水散布	
		植代後～移植 7 日前又は 移植直後～ノビエ 1 葉期 但し、移植後 30 日まで	300 <i>ml</i> (少量散布)	水口施用	
		移植直後～ノビエ 1 葉期 但し、移植後 30 日まで		田植同時散布機で施用	
		移植時			

※ジメタメトリンを含む農業の総使用回数：2 回以内

※ピリブチカルブを含む農業の総使用回数：2 回以内

※プレチクロール含む農業の総使用回数：2 回以内