

|   |  |
|---|--|
| <b>チアメトキサム水和剤<br/>クルーザー FS30</b>        | <b>取扱メーカー：</b><br>シンジェンタ<br><br><b>原体メーカー：</b><br>シンジェンタ   |
| <b>成分：</b> チアメトキサム〔ネオニコチノイド系〕……………30.0% | <b>性状：</b> 赤色水和性粘稠懸濁液体<br><b>毒性：</b> 普通物<br><b>消防法：</b> —— |

### 【品目特性】……………

- 種子処理専用が開発された製剤であり、種子に均一に処理する事ができ、また処理後の乾燥も速く、容易に塗沫処理作業ができる。
- 種子処理により、発芽直後からアブラムシ、タネバエ、ネキリムシ、フタスジヒメハムシ、ハリガネムシを防除できる。
- 種子の播き直しや防除作業を軽減させ、収量・品質の安定にも寄与する。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

### 【使用上のポイント】……………

- 原液のまま種子全体に均一に塗沫処理し、処理後は種子を平らな容器や新聞紙などに広げ、約1分から数分間乾燥させる。
- 殺菌剤を多重処理する場合は、先にクルーザーFS30を処理する。
- 種子処理方法（例）

例1. ビニール袋による塗沫処理【推奨：種子10～20kg程度】

ビニール袋に種子を入れ、計量した原液を種子の上に投入する。  
ビニール袋の口をしっかりとかとめ、上下左右によく振り、全体に均等に着色するまで混ぜる。

例2. ビニールシートによる塗沫処理【推奨：種子10～20kg程度】

シートの中央に種子を乗せ、計量した原液を種子の上に投入する。  
数人でシートの四隅を持ち、こぼれないようにゆすって全体に均等に着色するまで混ぜる。

例3. 肥料混和機による塗沫処理【推奨：種子10～30kg程度】

容器に種子を入れ、計量した原液を種子の上に投入する。

容器のふたを閉め、なるべく均一なスピードでハンドルを回し、種子全体に均等に着色するまで回転させる。

例4. ミキサーによる塗沫処理【推奨：種子30kg以上】

ミキサーに種子を入れ、計量した原液を種子の上に投入する。

種子全体に均等に着色するまでミキサーを回転させる。

### 【薬効・薬害等の注意】……………

- 使用前に容器をよく振ってから塗沫処理に供する。
- 薬剤を水等で希釈せずに使用する。
- 薬剤が種子に均一に付着するように処理する。
- 薬剤を処理した種子を食用など農業以外の分野で使用しない。
- 共通注意事項8. 適用作物群に関する注意事項を参照。

### 【安全対策上の注意】……………

- 甲殻類に影響を及ぼすおそれがあるので、使用時は注意。



【適用と使用法】 .....

| 作物名   | 適用害虫名           | 使用量                        | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | チアメトキサムを含む農薬の総使用回数                     |
|---|-----------------|----------------------------|------|---------|------|--|
| 小麦  | ヤギシロトビムシ        | 乾燥種子<br>1 kg 当り<br>原液 6 ml | は種前  | 1 回     | 塗沫処理 | 1 回                                    |
| 大豆  | アブラムシ類          |                            |      |         |      | 3 回以内<br>(は種前の塗沫処理は 1 回以内, は種後は 2 回以内) |
| だいず   | タネバエ            |                            |      |         |      |  |
| えだまめ  | ネキリムシ類          |                            |      |         |      | 1 回                                    |
|   | フタスジヒメハムシ       |                            |      |         |      |  |
| いんげんまめ                                      | アブラムシ類          |                            |      |         |      | 3 回以内<br>(は種前の塗沫処理は 1 回以内, は種後は 2 回以内) |
| 豆類<br>(種実, 但し,<br>らっかせい, だいず,<br>いんげんまめを除く) | タネバエ            |                            |      |         |      |  |
| とうもろこし(子実)                                  | ハリガネムシ類<br>タネバエ |                            |      |         |      | 3 回以内<br>(は種前の塗沫処理は 1 回以内, は種後は 2 回以内) |
| 未成熟とうもろこし                                   |                 |                            |      |         |      |  |
| 飼料用とうもろこし                                   |                 |                            |      |         |      | 1 回                                    |