| クロルピリホス粒剤<br><b>ダーズバン粒剤</b>                  | <b>取扱メーカー:</b><br>サンケイ,日産,琉産<br><b>原体メーカー:</b><br>ダウ |
|--|--|
| 成分: クロルピリホス〔有機リン系 PRTR・1 種〕 ············3.0% | 性状:類白色細粒<br>毒性:劇物<br>消防法:——                          |

## 

- ●害虫に対し接触毒,食毒として速効的に作用し,かつ残効性にも優れるので安定した効果が期待できる。
- ●コガネムシ類,ハリガネムシ類,ゾウムシ類などの難防除土壌害虫に有効である。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一 覧表」を参照。

## 【使用上のポイント】…………

● 植付時に使用する際は処理部の土壌中に薬剤が 均一に分布するようによく混和する。

## 【安全対策上の注意】 ……………

- ●つまみ菜, 間引き菜には使用しない。
- ●共通注意事項7. ミツバチに対する注意事項を 参照。
- ●散布器具・容器の洗浄水及び空容器は適切に処理する。





## 【適用と使用法】………………

| 作物名   | 適用害虫名               | 10 a 当り<br>使用量 | 使用時期            | 本剤の<br>使用回数 | 使用方法           | クロルピリホスを含む農薬の総使用回数 |    |
|-------|---------------------|----------------|-----------------|-------------|----------------|--------------------|----|
| かんしょ  | ハリガネムシ類             | - 9 kg         | 植付時生育期          | ・ 2回以内      | 全面土壌混和<br>又は   | - 2回以内             |    |
|       | コガネムシ類              |                |                 |             | 植溝土壌混和<br>全面散布 |                    |    |
|       | アリモドキゾウムシ<br>イモゾウムシ | 6 kg           | 但し,収穫<br>30日前まで |             | 株元散布           |                    |    |
| さとうきび | ハリガネムシ類             | 9 kg<br>6~9 kg | 植付時             | 枯什時         | 植溝土壌混和         |                    |    |
| つつじ類  | コガネムシ類              |                | 9 kg            | 個刀吋         | l 回            | 作条処理土壌混和           | 1回 |
| だいこん  | キスジノミハムシ<br>タネバエ    |                | は種時             | 1 12        | 播溝土壌混和         | 1 1                |    |