

エトフェンプロックス乳剤 トレボン EW	取扱メーカー： 北興，琉産 原体メーカー： 三井アグロ
成分： エトフェンプロックス〔ピレスロイド系 PRTR・1種〕…10.0%	性状： 類白色粘稠乳濁液体 毒性： 普通物 消防法： —

【品目特性】

- 水中に有効成分を乳化分散させた製剤。有機溶剤臭が少なく扱い易い。
- 作物への付着性が高く，効果が持続する。
- 水稻・野菜・花き・樹木に幅広い登録を持つ。また休耕田でのカメシ防除や乗用液剤少量散布機での処理にも対応している。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】

- ねぎのシロイチモジヨトウの防除に使用する場合は，食入前の若令幼虫期に散布する。
- 本剤を本田の水稻に対して希釈倍数300倍で散布する場合は，所定量を均一に散布できる乗用型の速度連動式地上液剤少量散布装置を使用する。

【薬効・薬害等の注意】

- 使用前には，容器をよく振ってから使用する。

【安全対策上の注意】

- 誤って飲み込んだ場合は吐き出させ，直ちに医師の手当てを受けさせる。
- 眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意する。眼に入った場合は直ちに水洗し，眼科医の手当を受ける。使用後は洗眼する。
- 共通注意事項6，街路・公園・堤とう等で使用する場合は注意を参照。
- 共通注意事項7，ミツバチに対する注意事項を参照。
- 共通注意事項8，適用作物群に対する注意事項を参照。
- 甲殻類，冷水魚に影響を及ぼすので，河川，養殖池等に飛散，流入しないよう注意して使用する。養殖池等周辺での使用はさける。なお，比較的低濃度でも魚が平衡失調を起こすおそれがあるので十分注意する。



作物名	適用場所	適用害虫名	希釈 倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	イトフェンブロックスを 含む農薬の総使用回数
た で あ い	—	アブラムシ類 ハスモンヨトウ	1000 倍	100～ 300 ℓ	—	6 回 以内	散布	6 回以内
樹 木 類 (つつじ類, いぬまぎを除く)		ケムシ類	2000 倍	100～ 700 ℓ	発生 初期			
つ つ じ 類		ツツジグンバイ	1000 倍					
		モンアシブトゾウムシ	2000 倍					
い ぬ ま き		ケブカトラカミキリ ケムシ類	2000 倍					
水 田 作 物, 畑 作 物 (休耕田)	ヨシ, オ ギ, スス キ, セイ タカアワ ダチソウ 等の多年 生雑草が 優占して いる休耕 田	カメムシ類	1000 倍	60～ 150 ℓ	—	3 回 以内		3 回以内