

<b>ジチアノン・フルキサピロキサド水和剤 セルカディス D フロアブル</b>	<b>取扱メーカー：</b> B A S F、日曹  <b>原体メーカー：</b> B A S F、B A S F
<b>成分：</b> ジチアノン〔PRTR・1種〕……………42.0% フルキサピロキサド……………4.7%	<b>性状：</b> 褐色水溶性粘稠懸濁液体 <b>毒性：</b> 劇物 <b>消防法：</b> ——

### 【品目特性】……………

- 作用性の異なる多作用点阻害剤と SDHI 剤の混合剤で幅広い病害に効果を示す。
- 浸透性に優れた成分と、胞子発芽を強く阻害し予防効果に優れた成分の組み合わせにより、安定した効果と長い残効性を示す。
- 他薬剤で効果が低下した病原菌にも安定した効果を示す。
- 耐雨性に優れる。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

### 【使用上のポイント】……………

- 使用に当たっては容器をよく振り、使用量にあわせて薬剤を調製し使いきる。

### 【薬効・薬害等の注意】……………

- 石灰硫黄合剤、ボルドー液との混用はさける。
- ハウス栽培のなしに対しては、薬害を生じるおそれがあるので使用しない。
- 機能性展着剤（アブローチ B I など）の加用は薬害を生じるおそれがあるのでさける。

### 【安全対策上の注意】……………

- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。
- 原液は眼に対して強い刺激性があるので、散布液調製時には保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当を受ける。
- 皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意する。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とす。
- 散布の際は防護マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用する。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換する。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する。
- カブレやすい体質の人は取扱いに十分注意する。
- 施設内で使用する場合、窓等を開放し十分に換気してから施設内に立ち入る。
- 魚類に強い影響を及ぼすおそれがあるので特に注意。



### 【適用と使用法】……………

作物名	適用病害名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の使用 回数	使用 方法	ジチアノンを含む 農薬の総使用回数	フルキサピロキサドを含む 農薬の総使用回数
りんご	モニリア病 黒星病 斑点落葉病 黒点病 褐斑病	1500 倍	200～ 700 ℓ	60 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内	3 回以内
なし	赤星病 黒斑病 黒星病						5 回以内	
もも	灰星病			7 日前まで			4 回以内	
ネクタリン	黒星病			14 日前まで	2 回以内		2 回以内	2 回以内