

クロラントラニプロール・チフルザミド・プロベナゾール粒剤 <b>Dr. オリゼフェルテラグレータム粒剤</b>	取扱メーカー： 北興，Meiji  原体メーカー： FMC，B A S F，Meiji
成分：クロラントラニプロール〔アントラニリックジアミド系〕…0.75% チフルザミド〔酸アミド系〕……………3.0% プロベナゾール……………24.0%	性状：淡褐色細粒 毒性：普通物 消防法：——

### 【適用と使用方法】 .....

作物名	適用病害虫名	1箱*当り 使用量	使用時期	使用方法	総使用回数
稲	いもち病 イネミズゾウムシ イネドロオイムシ	1kg/10a	は種時	は種同時 施業機を 用いて土 中施用す る。	本剤 1回 クロラントラニプロール 1回 チフルザミド 3回以内 (直播ではは種時又は移植時ま での処理は1回以内，本田では 2回以内)
			移植時	側条施用	プロベナゾール 2回以内 (移植時までの処理は1回以内)
稲 (箱育苗)	いもち病 白葉枯病 もみ枯細菌病 紋枯病 イネミズゾウムシ イネドロオイムシ ツマグロヨコバイ フタオビコヤガ	50 g	移植3日前 ～移植当日	育苗箱の 苗の上か ら均一に 散布する。	本剤 1回 クロラントラニプロール 1回 チフルザミド 3回以内 (移植時までの処理は1回以内， 本田では2回以内) プロベナゾール 2回以内 (移植時までの処理は1回以内)

\* 育苗箱は30×60×3cm，使用土壌約5ℓ