

シベルメトリン水和剤 ゲットアウト WDG	取扱メーカー： ホクサン、住友化学 原体メーカー： 住友化学
成分： シベルメトリン〔ピレスロイド系〕……………9.0% その他 PRTR 該当成分： 無水硼酸〔PRTR・1種〕……………2.5%以下 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩〔PRTR・1種〕……………1.8%以下	性状： 類白色水和性細粒 毒性： 劇物 消防法： ——

【品目特性】……………

- 接触作用により強い殺虫力を示す。害虫が薬剤に触れるとその反応は速い。
- 優れた速効性、残効性を有し、高い防除効果を示す。
- WDG（顆粒水和剤）なので、粉立ちが少なく、溶けやすいため使い易い薬剤である。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- 残効性と忌避性を生かして、害虫発生初期に使用するとより効果的である。
- 浸透移行性・ガス効果が弱いので、薬液をムラなく散布する。

【薬効・薬害等の注意】……………

- ボルドー液と混用する場合は使用直前に混合する。
- てんさいに対し希釈倍数750倍で散布する場合は、少量散布可能なスプレーヤーもしくはノズルを利用する。

【安全対策上の注意】……………

- のど、鼻、皮膚などへの刺激やカユミを生じる場合があるので注意する。
- 魚類、甲殻類に影響を及ぼすおそれがあるので、使用時は注意。
- 共通注意事項7. ミツバチに対する注意事項を参照。
- 散布器具・容器の洗浄水及び空袋等は適切に処理する。



【適用と使用方法】

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤及びシベルメトリン を含む農薬の総使用回数	使用 方法
ば れ い し ょ	アブラムシ類 ナストビハムシ	2000～ 3000倍	100～ 300 ℓ	7 日前まで	4 回以内	散布
や ま の い も	アブラムシ類	3000倍	60～ 150 ℓ	前日まで	3 回以内	
麦 類		3000～ 4000倍		21 日前まで		
とうもろこし	アブラムシ類 アワヨトウ アワノメイガ カメムシ類	3000 倍	100～ 300 ℓ	7 日前まで		
豆 類 (種実、但し、 だいず、あずき を除く)	アブラムシ類					
だ い ず	アブラムシ類 マメシンクイガ カメムシ類					
あ ず き	アブラムシ類 ノメイガ類 マメホソクチゾウムシ					
た ま ね ぎ	アザミウマ類	2000～ 3000倍	100～ 500 ℓ	前日まで	5 回以内	
だ い こ ん	アブラムシ類	3000 倍				
か ぼ ち や	ヨトウムシ			前日まで		
からしな(種子)	ヨトウムシ			14 日前まで	3 回以内	
え だ ま め	アブラムシ類 マメシンクイガ			7 日前まで		
に ん じ ん	アブラムシ類 ヨトウムシ			14 日前まで	5 回以内	
ご ぼ う	アブラムシ類			7 日前まで		
キ ャ ベ ツ	アオムシ	100～ 500 ℓ		前日まで	3 回以内	
アスパラガス	ヨトウムシ	750倍	25 ℓ	14 日前まで	4 回以内	
て ん さ い	カメノコハムシ テンサイトビハムシ	2000～ 3000倍	100～ 300 ℓ			