

調合油乳剤 サフオイル乳剤	取扱メーカー： O A T 原体メーカー： O A T
成分： 調合油（サフラワー油及び綿実油の含量として）…97.0%	性状： 淡黄色澄明可乳化油状液体 毒性： 普通物 消防法： ——

【品目特性】

- ハダニ類，チャノホコリダニ，トマトサビダニ，コナジラミ類に対して接触型の物理的作用で死亡させる。
- 既存の薬剤に対して抵抗性の発達したハダニ類及びコナジラミ類にも効果。
- 殺卵活性も認められ，ハダニ類及びコナジラミ類の全発育ステージに効果。
- ハダニへの残効性が認められる。
- 天敵や訪花昆虫に対する影響が小さい。
- 有機 JAS 使用可能農薬。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】

- 薬液調製に際してはよくかき混ぜ，散布液調製後は，攪拌しながらできるだけ速やかに散布する。
- 残効性が短いため害虫の増殖や圃場外からの飛び込みが活発な時には，数日（5～10日）間隔で連続散布や，他剤との輪番散布を行う。

【薬効・薬害等の注意】

- 高温時や軟弱徒長苗では薬害を生じるおそれがあるので使用をさける。
- カーネーションに使用する場合，葉表面のブルームが溶脱する等の薬害を生じる場合があるので，初めて使用する場合は使用者の責任において事前に薬害の有無を十分に確認してから使用する。

【適用と使用方法】

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	調合油を含む農 薬の総使用回数
か ん き つ	ミカンハダニ	500倍	200～ 700 ℓ	収穫前日 まで	—	散布	—
野 菜 類 (いちご,トマト, ミニトマトを 除く)	ハダニ類	300～ 500倍	100～ 500 ℓ				
	チャノホコリダニ コナジラミ類 うどんこ病	300倍					
い ち ご	ハダニ類	300～ 500倍		—		定植前	
	チャノホコリダニ コナジラミ類 うどんこ病	300倍	100～ 500 ℓ	収穫前日 まで		散布	
	ト マ ト ミニトマト	ハダニ類					
チャノホコリダニ トマトサビダニ コナジラミ類 うどんこ病		300倍					
花き類・観葉植物 (きくを除く)	ハダニ類	500倍	100～ 500 ℓ	発生初期			
き く		300～ 500倍					