

テフリルトリオン・ピラクロニル・メタゾスルフロン剤 コメント (1キロ粒剤 / ジャンボ / フロアブル)	取扱メーカー： 日産 原体メーカー： 全農・バイエル・北興、協友アグリ、日産
成分： テフリルトリオン〔トリケトン系〕 ……2.0%(粒剤), 6.7%(ジャンボ), 4.0%(フロアブル) ピラクロニル ……2.0%(粒剤), 6.6%(ジャンボ), 4.0%(フロアブル) メタゾスルフロン〔スルホニルウレア系〕 ……0.60%(粒剤), 2.0%(ジャンボ), 1.2%(フロアブル)	性状： 類白色細粒 (粒剤) 淡褐色細粒 水溶性パック入り 1パック30g(ジャンボ) 淡褐色水溶性粘稠懸濁液体 (フロアブル) 毒性： 普通物 消防法： —

【品目特性】…………… 〈共通〉

- ホタルイやクログワイなど多年生雑草にも卓効を示す一発処理除草剤。
 - 多年生雑草の塊茎形成も抑制、翌年の発生要因を減らすことが可能。
 - コナギ、アゼナなどスルホニルウレア抵抗性雑草にも高い効果を示す。
 - 有効成分の特性は、参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。
- 〈粒剤〉
- 田植同時散布も可能。

【使用上のポイント】…………… 〈共通〉

- 共通注意事項の5. 水稻除草剤散布 使用上のポイントを参照。
- 本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエ2.5葉期までに時期を失しないように散布する。
- 多年生雑草は生育段階によって効果にフレがあるので、必ず適期に散布するように注意する。

雑草名	散布適期		
	粒剤	ジャンボ	フロアブル
ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヘラオモダカ	2葉期まで		
ヒルムシロ	発生期まで		
セリ	再生始期まで		
オモダカ	発生始期まで	ヘラ葉期まで	
クログワイ		草丈10cmまで	
シズイ	草丈3cmまで		
コウキヤガラ	草丈10cmまで		
アオミドロ・藻類 による表層はく離	発生前	—	

●オモダカ、クログワイ、シズイ、コウキヤガラに対しては、必要に応じて有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

【薬効・薬害等の注意】…………… 〈共通〉

- 共通注意事項の5. 水稻除草剤散布 薬効・薬害等の注意を参照。
- 適用作物 (水稻) の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。
- 適用外作物 (いぐさ、れんこん、せり、くわい) への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

〈粒剤〉

- 直播水稻に使用する場合は、薬害をさけるため稲の1葉期以降に使用し、稲の根が露出しているときの使用はさける。

〈ジャンボ〉

- 本剤は小包装 (パック) のまま10 a 当たり10個の割合で水田に均等に投げ入れる。
- 散布時は圃場の水深を5cm以上にして実施する。

【安全対策上の注意】…………… 〈共通〉

- 藻類に影響を及ぼすので、使用時並びに使用後も注意。
- 散布器具・容器の洗浄水及び空容器は適切に処理する。

〈粒剤〉

- 無人航空機散布の際は、共通注意事項の2. 空中散布及び無人航空機 (無人ヘリコプター等) による散布・滴下に関する注意事項を参照。

〈フロアブル〉

- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。

【適用と使用方法】

①コメット 1 キロ粒剤

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヘラオモダカ ヒルムシロ セリ	移植時	1 kg	田植同時散布 機で施用	1 回※
	オモダカ クログワイ コウキヤガラ シズイ アオミドロ・藻類による 表層はく離	移植直後～ ノビエ 2.5 葉期 但し、移植後 30 日まで		湛水散布 又は 無人航空機に よる散布	
直播水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヒルムシロ セリ	稲 1 葉期～ ノビエ 2.5 葉期 但し、収穫 60 日前まで			

※テフリルトリオンを含む農薬の総使用回数：2回以内

※ピラクロニルを含む農薬の総使用回数：2回以内

※メタゾスルフロンを含む農薬の総使用回数：2回以内

②コメットジャンボ

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヘラオモダカ ヒルムシロ セリ オモダカ クログワイ シズイ コウキヤガラ	移植後 5 日～ ノビエ 2.5 葉期 但し、 移植後 30 日まで	小包装 (パック) 10 個 (300g)	水田に小包装 (パック) のま ま投げ入れる。	1 回※

※テフリルトリオンを含む農薬の総使用回数：2回以内

※ピラクロニルを含む農薬の総使用回数：2回以内

※メタゾスルフロンを含む農薬の総使用回数：2回以内

③コメットフロアブル

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヘラオモダカ ヒルムシロ セリ オモダカ クログワイ コウキヤガラ シズイ	移植後5日～ ノビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで	500 ml	原液湛水散布	1回 ※

※テフリルトリオンを含む農薬の総使用回数：2回以内

※ピラクロニルを含む農薬の総使用回数：2回以内

※メタゾスルフロンを含む農薬の総使用回数：2回以内