

脂肪酸グリセリド・スピノサド水和剤 ダブルシューター SE	取扱メーカー： サンケイ，ダウ 原体メーカー： サンケイ，ダウ
成分： 脂肪酸グリセリド……………75.0% スピノサド……………5.0%	性状： 淡黄色水和性粘稠懸濁液体 毒性： 普通物 消防法： 第4類・第4石油類（非水溶性）・危険物等級III

【品目特性】……………

- コナジラミ類・ハダニ類・ハモグリバエ類・アザミウマ類を同時に防除可能。
- 全生育ステージ（卵，幼虫，成虫）のコナジラミ類に優れた効果。
- 2つの有効成分の相乗効果で低活性の害虫へ優れた活性と安定した効き目。
- 収穫前日まで使用可能（花き類・観葉植物は発生初期）。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- 使用直前によく容器を振る。

- 散布ムラを生じないように薬液が葉裏等にも十分かかるよう丁寧に散布する。

【薬効・薬害等の注意】……………

- キャブタンを含む農薬又はアゾキシストロビンを含む農薬との同時施用もしくは近接散布は薬害を生じるおそれがあるのでさける。

【安全対策上の注意】……………

- 共通注意事項7. ミツバチに対する注意事項を参照。



【適用と使用法】……………

作物名	適用害虫名	希釈 倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	脂肪酸グリセリドを含 む農薬の総使用回数	スピノサドを含む 農薬の総使用回数
ピーマン	ハダニ類 コナジラミ類 アザミウマ類 オオタバコガ	1000 倍	100～ 300 ℓ	収穫前日 まで	2回以内	散布	—	2回以内
トマト ミニトマト なす	ハダニ類 コナジラミ類 ハモグリバエ類 アザミウマ類 オオタバコガ							
花き類・観葉植物	ハダニ類 アザミウマ類			発生初期				