

アジムスルフロン・ペノキスラム・メソトリオン粒剤 セカンドショット S ジャンボ MX	取扱メーカー： 三井アグロ 原体メーカー： FMC, ダウ, シンジェンタ
成分： アジムスルフロン〔スルホニルウレア系〕……………0.36% ペノキスラム〔スルホンアミド系〕……………0.36% メソトリオン〔トリケトン系〕……………2.0%	性状： 淡褐色細粒 水溶性パック入り 1パック25g 毒性： 普通物 消防法： ——

【品目特性】……………

- 水稲用中期除草剤。
- 「中期にSジャンボ」。淡水状態で10a当り20個投げ込むだけの省力中期除草剤。
- 新技術だから拡散力が違う。拡散スピードが早いので稲が成長している中期でも拡散不良が起きにくくなっている。
- 取りこぼした雑草を幅広く防除。ノビエはもちろん、SU抵抗性雑草（コナギ、ホタルイ等）からクログワイ、オモダカ等まで幅広い雑草に効果を示す。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- 小包装（パック）のまま10a当り20個の割合で、畦畔から水田に均等に投げ入れる。
- 移植水稲はノビエの3.5葉期まで、直播水稲はノビエの4葉期までに時期を失ないように散布する。
- 多年生雑草は生育段階によって効果にフレがあるので、必ず適期に散布するように注意する。

雑草名	散布適期	
	移植水稲	直播水稲
ホタルイ	草丈10cm まで	3 葉期まで
へらオモダカ	3 葉期まで	
ミズカヤツリ	草丈15cm まで	
ウリカワ	4 葉期まで	
クログワイ	草丈20cm まで	
オモダカ	矢じり葉3 葉期まで	
ヒルムシロ	発生盛期まで	発生期まで
セリ	再生期まで	
コウキヤガラ	草丈20cm まで	
キシュウズメノヒエ	再生茎4 葉期まで	

- クログワイ、オモダカは必要に応じて有効な前処理剤と組み合わせて使用する。また、クログワイ、オモダカに有効な前処理剤と組み合わせて連年施用することにより、さらに効果が向上する。
- 処理に当たっては、水の出入りを止めて水深5～6cmの湛水状態にする。

【薬効・薬害等の注意】……………

- 前処理剤との体系で使用し、雑草の発生状況をよく確認し、時期を失ないように散布する。
- 必要量を購入し、できるだけ残すことなく使いきる。
- 補植は必ず散布前に行う。
- 本剤はその殺草特性からいぐさ、れんこん、せり、くわいなどの生育を阻害するおそれがあるので、これら作物の生育期に隣接田で使用する場合は、十分注意する。
- 共通注意事項5. 水稲除草剤散布 薬効・薬害等の注意を参照。

【安全対策上の注意】……………

- 水溶性フィルム包装が破袋した場合は以下の点に注意する。
 - 眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。
 - 皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意する。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とす。
- 水溶性フィルムは吸湿性があるので湿気には十分注意し、使い残りは外袋の口を強く閉じて保管する。また、強く加圧されると水溶性フィルムが劣化するおそれがあるので下積みにならないようにする。



【適用と使用法】

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稻	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ ウリカワ クログワイ オモダカ ヒルムシロ セリ コウキヤガラ キシウスズメノヒエ	移植後 14 日～ ノビエ 3.5 葉期 但し、 収穫 45 日前まで	小包装 (パック) 20 個 (500g)	水田に小包装 (パック) のまま 投げ入れる。	1 回 ※
直播水稻	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ セリ	稲 4 葉期～ ノビエ 4 葉期 但し、 収穫 45 日前まで			

※アジムスルフロンを含む農薬の総使用回数：1 回

※ペノキスラムを含む農薬の総使用回数：2 回以内

※メソトリオンを含む農薬の総使用回数：2 回以内