

エマメクチン安息香酸塩乳剤 アフーム乳剤	取扱メーカー： シンジェンタ 原体メーカー： シンジェンタ
成分： エマメクチン安息香酸塩〔マクロライド系 PRTR・1種〕…1.0% その他 PRTR 該当成分： 2,6-ジ-ターシャリーブチル-4-クレゾール〔PRTR・1種〕…1%	性状： 淡黄色澄明可乳化油状液体 毒性： 普通物 消防法： 第4類・第2石油類（非水溶性）・危険等級III

【品目特性】

- チョウ目害虫，アザミウマ類に卓効を示す，マクロライド系の殺虫剤である。
- 害虫の抑制性神経系に作用し，害虫は摂食を停止し，行動が緩慢となり死亡する。
- 害虫に対して経皮毒としても作用するが，食毒作用が顕著である。
- 既存薬剤に抵抗性を示す害虫に対しても有効である。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】

- 散布ムラの無いように丁寧に散布する。

【薬効・薬害等の注意】

- 共通注意事項8，適用作物群に関する注意事項を参照。

【安全対策上の注意】

- 自動車，壁などの塗装面，大理石，御影石等に散布液がかからないよう注意する。
- 散布器具・容器の洗浄水及び空容器は適切に処理する。
- ミツバチ及びマルハナバチ等に対して影響があるので，以下のことに注意する。
 - ミツバチ及びマルハナバチ等の巣箱及びその周辺にかからないようにする。
 - 受粉促進を目的としてミツバチ及びマルハナバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用を避ける。
- 共通注意事項7，ミツバチに対する注意事項を参照。



【適用と使用法】

作物名	適用害虫名	希釈 倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	エマメクチン安息香酸塩を含む農薬の総使用回数	
み か ん	アザミウマ類 ミカンハモグリガ	1000～ 2000倍	200～ 700 ℓ	3日前まで	2回以内	散布	2回以内	
未成熟とうもろこし	オオタバコガ ヨトウムシ			30日前まで				
とうもろこし (子実)				前日まで				
ヤングコーン								
か ん し ょ	ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ	100～ 300 ℓ		7日前まで	3回以内		3回以内	
え だ ま め	ハスモンヨトウ							
さやえんどう								
豆 類 (未成熟、但し、 さやいんげんを除く)	ハモグリバエ類	2000倍		3日前まで	2回以内		2回以内	

作物名	適用害虫名	希釈 倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	イマメクチン安忌香酸塩 を含む農薬の総使用回数			
さやいんげん	ハモグリバエ類	2000 倍	100 ～ 300 ℓ	前日まで	2回以内	散布	2 回以内			
す い か	アザミウマ類	1000 ～ 2000 倍			3回以内		3 回以内			
	コナジラミ類	2000 倍						2 回以内		
き ゆ う り	アザミウマ類 ウリノメイガ ハスモンヨトウ ハモグリバエ類 コナジラミ類									
ズ ッ キ ー ニ に が う り	オオタバコガ			3日前まで					2回以内	
う り 類 (漬物用)	オオタバコガ ハスモンヨトウ ハダニ類 アザミウマ類 ハモグリバエ類	2000 倍					2 回以内			
	メ ロ ン							アザミウマ類		1000 ～ 2000 倍
か ぼ ち や	ウリノメイガ ハモグリバエ類 コナジラミ類							2000 倍		
	アザミウマ類									
ト マ ト ミ ニ ト マ ト	ハモグリバエ類 オオタバコガ トマトサビダニ コナジラミ類	2000 倍			7日前まで					
な す	アザミウマ類 ハモグリバエ類 チャノホコリダニ ハダニ類 オオタバコガ ハスモンヨトウ コナジラミ類									
ビ ー マ ン	オオタバコガ コナジラミ類									
とうがらし類	オオタバコガ				7日前まで				3 回以内	
キ ャ ベ ツ	コナガ アオムシ ヨトウムシ タマナギンウワバ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ	1000 ～ 2000 倍			前日まで					
	メ キャベツ 非結球メキャベツ	ハスモンヨトウ		1000 倍	3日前まで		3回以内			
は く さ い	コナガ アオムシ ヨトウムシ	1000 ～ 2000 倍			7日前まで					
	だ い こ ん									
カリフラワー	ハイマダラノメイガ	2000 倍			3日前まで					
	コナガ アオムシ アザミウマ類 オオタバコガ	1000 ～ 2000 倍								

作物名	適用害虫名	希釈 倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	エマメクチン安忌香酸塩 を含む農薬の総使用回数	
ブロッコリー	コナガ アオムシ ヨトウムシ オオタバコガ	1000～ 2000倍	100～ 300 ℓ	3日前まで	3回以内	散布	3回以内	
な ば な 類	コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ			2回以内	2回以内			
	アオムシ コナガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ ハモグリバエ類 アザミウマ類 ハイマダラノメイガ			3回以内	3回以内			
非結球あぶらな科 葉 菜 類 (のぎわな、 チンゲンサイ、 こまつなを除く)	アオムシ コナガ			3日前まで	2回以内		2回以内	
の ぎ わ な チンゲンサイ	コナガ							
こ ま つ な か ぶ	コナガ	2000倍		2回以内	2回以内			
レ タ ス 非結球レタス	ハスモンヨトウ オオタバコガ ナモグリバエ	1000～ 2000倍		3回以内	3回以内			
し ゅ ん ぎ く	ハモグリバエ類 アザミウマ類 シロイチモジヨトウ	2000倍		7日前まで	2回以内		2回以内	
すいぜんじな	タマナギンウワバ ハモグリバエ類 アザミウマ類 ヨトウムシ ハスモンヨトウ オオタバコガ			前日まで				
	ハスモンヨトウ オオタバコガ			7日前まで				
ト レ ビ ス	オオタバコガ			1000倍				前日まで
セ ル リ ー	ハモグリバエ類 オオタバコガ タバコガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ	2000倍		7日前まで				
	パ セ リ			ハスモンヨトウ	1回		1 回	
み つ ば	ハダニ類 キアゲハ ヨトウムシ ハスモンヨトウ			1000倍	7日前まで 但し、伏せ 込み栽培は 伏せ込み前 まで		2回以内	2回以内
に ん じ ん	ハモグリバエ類				前日まで		3回以内	3回以内
ね ぎ	シロイチモジヨトウ	1000～ 2000倍						
わ け ぎ あ さ つ き								

作物名	適用害虫名	希釈 倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	エマメクチン [®] 安曇香酸塩 を含む農薬の総使用回数
しそ	ヨトウムシ ハスモンヨトウ ハダニ類 シソサビダニ	2000倍	100～ 300 ℓ	7日前まで	2回以内	散布	2回以内
いちご	オオタバコガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ ハダニ類			前日まで			
オクラ	オオタバコガ						
アスパラガス	オオタバコガ ハスモンヨトウ ヨトウムシ			3日前まで			
ほうれんそう	ハスモンヨトウ ホウレンソウケナガコナダニ						
みょうが (花穂)	ハダニ類			前日まで			
みょうが (茎葉)		みょうが (花穂)の 収穫前日まで 但し、 花穂を収穫しない場合 にあつては開花期終了 まで					
エンサイ 葉しょうが		7日前まで	3回以内				
モロヘイヤ		前日まで					
食用ぎく	アザミウマ類		14日前まで	1回	散布	1回	
茶	チャノコカクモンハマキ ヨモギエダシャク チャノキイロアザミウマ チャノホソガ チャハマキ	1000～ 2000倍	200～ 400 ℓ				摘採7日前 まで
	チャノホコリダニ ハスモンヨトウ	2000倍					
花き類・ 観葉植物	オオタバコガ ハモグリバエ類 ヨトウムシ類	1000倍	100～ 300 ℓ	発生初期	5回以内	5回以内	
きく	アザミウマ類	2000倍					
ストック	コナガ	1000～ 2000倍					
マーガレット	ハスモンヨトウ	2000倍					