

<b>トリアファモン・フェンキノトリオン剤</b> <b>プライオリティ</b> <b>(豆つぶ250/ジャンボ)</b>	<b>取扱メーカー：</b> クミカ  <b>原体メーカー：</b> バイエル、クミカ
<b>成分：</b> トリアファモン〔スルホンアニリド系〕 .....2.0% (豆つぶ), 2.0% (ジャンボ) フェンキノトリオン .....12.0% (豆つぶ), 12.0% (ジャンボ)	<b>性状：</b> 淡黄色粒状 粒径3～8mm (豆つぶ) 淡黄色粒状水溶性パック入り 1パック25g (ジャンボ)  <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> ——

## 【品目特性】 .....

### 〈共通〉

- 一年生及び多年生雑草の幅広い草種に高い効果を示し、コナギやミズアオイ、オモダカなどの広葉雑草、ホタルイ、コウキヤガラなどのカヤツリグサ科雑草に対して白化作用を示す。
- 2成分の初・中期一発剤。
- 3.5葉期までのノビエに卓効を示す。
- スルホンウレア剤に感受性が低下した雑草に対しても安定した効果を示す。
- 高い水稻安全性を示し、移植直後から使用できる。また、表面は種を含む直播栽培に稲出芽揃期から使用できる。
- フェンキノトリオンは、既存のHPPD剤感受性の飼料米品種等への安全性も確認されている。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

## 【使用上のポイント】 .....

### 〈共通〉

- 共通注意事項の5、水稲除草剤散布 使用上のポイントを参照。
- 雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの3.5葉期までに、時期を失ないように散布する。
- 多年生雑草は生育段階によって効果にフレがあるので、必ず適期に散布する。

雑草名	散布適期	
	豆つぶ	ジャンボ
ホタルイ へらオモダカ	4葉期まで	
ウリカワ	3葉期まで	
ミズガヤツリ	4葉期まで	
クログワイ オモダカ コウキヤガラ	発生始期まで	
ヒルムシロ	発生盛期まで	
セリ	増殖期まで	
シズイ	草丈3cmまで	
エゾノサヤヌカグサ	2葉期まで	
キシウスズメノヒエ	3葉期まで	

- オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイは発生期間が長く、遅い発生のもまでは十分な効果を示さないで、必要に応じて有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

### 〈豆つぶ〉

- 湛水散布又は湛水周縁散布に当たっては、やや深めの湛水状態（水深5～6cm）にして水の出入りを止める。
- 湛水散布の場合は田面に散布し、また、湛水周縁散布の場合は、水田周縁部に沿って帯状に散布する。
- 水口施用の場合は、あらかじめ1～2cm程度水深を確保した状態で、入水時に水口に施用し、流入水とともに水田全面に拡散させ、施用後田面水が通常の湛水状態（湛水深3～5cm）に達した時に必ず水を止め、田面水があふれ出ないように注意する。
- 藻類・表層はく離などの水面浮遊物が多い場合は、拡散が不十分になるおそれがあるため周縁散布又は水口施用をさけ、本田内で水田全面に散布する。
- 水口に対して風速5m/sを超える向かい風が吹

いている場合は、本剤の拡散が不十分になるおそれがあるため水口施用をさける。

●吸湿性があるので、散布時に降雨の場合には濡れないように注意して散布する。濡れた手で扱わない。開封後は早めに使用する。

●無人航空機散布の際は、共通注意事項の2. 空中散布及び無人航空機（無人ヘリコプター等）による散布・滴下に関する注意事項を参照。

〈ジャンボ〉

●散布の際は、やや深めの湛水状態（水深5～6cm）にして水の出入りを止める。

●小包装（パック）のまま10 a 当り10個の割合で水田に均一に投げ入れる。

●濡れた手で作業したり、降雨で破袋することがないように注意する。

## 【薬効・薬害等の注意】……………

〈共通〉

●共通注意事項の5. 水稲除草剤散布 薬効・薬害等の注意を参照。

●適用作物（水稲）への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

●直播水稲に使用する場合、以下の点に注意する。

○は種時に通常の湛水状態より水を落として散布する場合は、散布後速やかに通常の湛水状態（水深3～5cm）にする。

○稲の根が露出した条件では薬害を生じるおそれがあるので使用をさける。

○除草効果の低下と生育抑制の薬害が発生するおそれがあるので、水持ちの安定した後に散布する。

●薬害のおそれがあるので、後作物としてなす、たまねぎ及びさやえんどうを栽培しない。

●適用外作物（いぐさ、れんこん、せり、くわい）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

## 【安全対策上の注意】……………

〈共通〉

●カブレやすい体質の人は取扱いに十分注意する。

〈豆つぶ〉

●眼に対して強い刺激性があるので眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに十分水洗し、眼科医の手当を受ける。

●使用の際は保護眼鏡、農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換する。

●作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する。

●蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。

●無人航空機散布の際は、共通注意事項の2. 空中散布及び無人航空機（無人ヘリコプター等）による散布・滴下に関する注意事項を参照。

〈ジャンボ〉

●濡れた手で触らない。

●水溶性フィルム包装が破袋した場合、眼に対して強い刺激性があるので眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当を受ける。

〈豆つぶ〉



【適用と使用法】.....

① プライオリティ豆つぶ250

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稻	一年生雑草 多年生雑草	移植直後～ ノビエ3.5葉期 但し、 移植後30日まで	250g	湛水散布， 湛水周縁散布， 水口施用又は 無人航空機による 散布	1回※
直播水稻	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヒルムシロ セリ	稲出芽揃期～ ノビエ3.5葉期 但し、 収穫90日前まで		湛水散布又は 無人航空機による 散布	

※トリアファモンを含む農薬の総使用回数：2回以内  
※フェンキノトリオンを含む農薬の総使用回数：2回以内

② プライオリティジャンボ

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稻	一年生雑草 多年生雑草	移植直後～ ノビエ3.5葉期 但し、 移植後30日まで	小包装 (パック) 10個 (250g)	水田に小包装 (パック) のまま 投げ入れる	1回※
直播水稻	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヒルムシロ セリ	稲出芽揃期～ ノビエ3.5葉期 但し、 収穫90日前まで			

※トリアファモンを含む農薬の総使用回数：2回以内  
※フェンキノトリオンを含む農薬の総使用回数：2回以内