

<b>カフェンストロール・シクロスルファミロン・ダイムロン・ベンゾビシクロン剤 サスケ (粒剤 200 / ラジカルジャンボ)</b>	<b>取扱メーカー：</b> O A T <b>原体メーカー：</b> エス・ディー・エス, B A S F, エス・ディー・エス, エス・ディー・エス
<b>成分：</b> カフェンストロール(酸アミド系 PRTR・1種)…10.5% (粒剤), 10.5% (ジャンボ) シクロスルファミロン(スルホニルウレア系) …2.25% (粒剤), 2.25% (ジャンボ) ダイムロン(尿素系) …22.5% (粒剤), 22.5% (ジャンボ) ベンゾビシクロン(ビシクロオクタン系) …10.0% (粒剤), 10.0% (ジャンボ)	<b>性状：</b> 類白色細粒 (粒剤) 類白色細粒, 水溶性パック入り, 1 パック 20g (ジャンボ) <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> —

## 【品目特性】 ……………

### 〈共通〉

- ノビエなどの一年生雑草やウリカワなどの多年生雑草にも優れた効果と長い残効を発揮する。また、アシカキ、イボグサ等の畦畔からの侵入雑草にも有効である。ホタルイ、コナギ、アゼナ類などスルホニルウレア抵抗性雑草にも効果を示す。
- 優れた自己拡散性があり、早くムラなく広がる。
- 散布適期は田植後3日からノビエ2葉期まで。長期間に渡り効果が持続するので、残効切れを心配することなく早めの処理が可能である。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

### 〈粒剤〉

- ドローン（産業用マルチローター）散布防除できる。

### 〈ジャンボ〉

- 20 g パック剤を10 a 当たり10個投げ入れるだけで中の粒剤が自らの力で拡散し、1 パックで約1 a の広さを防除できる。
- 畦畔からの散布が可能。
- パックのまま処理するので、散布する人や周辺作物に対して散布時の飛散のおそれがない。

## 【使用上のポイント】 ……………

### 〈共通〉

- 共通注意事項の5. 水稲除草剤散布 使用上のポイントを参照。
- 雑草の発生前から生育初期に有効のため、ノビエの2葉期までに時期を失ないように散布する。
- 多年生雑草は生育段階によって効果にフレがあるので、必ず適期に散布する。各雑草の散布適期は以下のとおり。

雑草名	散布適期	
	粒剤	ジャンボ
ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ	2 葉期まで	
ヘラオモダカ	発生始まで	
ヒルムシロ	発生期まで	
セリ イボクサ(一年生)	再生前～発生始まで	
クログワイ オモダカ アオミドロ・藻類 による表層はく離	発生前まで	

## 【薬効・薬害等の注意】 ……………

### 〈共通〉

- 共通注意事項の5. 水稲除草剤散布 薬効・薬害等の注意を参照。
- 散布後数日間著しく高温が続く場合、初期生育が抑制されることがあるが、一過性のもので次第に回復し、その後の生育に対する影響は認めない。
- 直播水稲に使用する場合は、適切な覆土を行い、稲の1葉期以降に散布する。稲の根が露出した条件では薬害を生じるおそれがあるので使用しない。
- 適用作物（水稲）への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。
- 殺草特性からいぐさ、れんこん、せり、くわいなどの生育を阻害するおそれがあるので、これらの作物の生育期に隣接田で使用する場合は、十分注意する。
- いぐさ栽培予定水田では、使用しない。

## 【安全対策上の注意】 .....

### 〈共通〉

- 眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当てを受ける。
- 皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないように注意する。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とす。
- カブレやすい体質の人は取扱いに十分注意する。

### 〈粒剤〉

- 無人航空機散布の際は、共通注意事項の2. 空中散布及び無人航空機（無人ヘリコプター等）による散布・滴下に関する注意事項を参照。

### 〈粒剤〉



## 【適用と使用法】 .....

### ①サスケ粒剤200

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稲	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヘラオモダカ クログワイ オモダカ ヒルムシロ セリ アオミドロ・藻類による表層はく離	移植後3日～ ノビエ2葉期 但し、 移植後30日まで	200 g	水口施用、 湛水散布 又は 無人航空機による散布	1 回 ※
直播水稲	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヒルムシロ セリ	稲1葉期～ ノビエ2葉期 但し、 収穫60日前まで		湛水散布 又は 無人航空機による散布	

※カフェンストロールを含む農薬の総使用回数 : 1 回

※シクロスルファミロンを含む農薬の総使用回数 : 2 回以内

※ダイムロンを含む農薬の総使用回数 : 移植水稲 3 回以内(育苗箱散布は 1 回以内、本田では 2 回以内)  
直播水稲 2 回以内

※ベンゾピシクロンを含む農薬の総使用回数 : 3 回以内

## ②サスケ - ラジカルジャンボ

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稻	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヘラオモダカ クログワイ オモダカ ヒルムシロ セリ アオミドロ・藻類に よる表層はく離	移植後 3 日～ ノビエ 2 葉期 但し、 移植後 30 日まで	小包装 (パック) 10 個 (200 g)	水口施用又は 水田に小包装 (パック) のま ま投げ入れる。	1 回 ※
直播水稻	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヒルムシロ セリ	稲 1 葉期～ ノビエ 2 葉期 但し、 収穫 60 日前まで		水田に小包装 (パック) のま ま投げ入れる。	

※カフェンストロールを含む農薬の総使用回数 : 1 回

※シクロスルフアムロンを含む農薬の総使用回数 : 2 回以内

※ダイムロンを含む農薬の総使用回数 : 移植水稻 3 回以内(育苗箱散布は 1 回以内, 本田では 2 回以内)  
直播水稻 2 回以内

※ベンゾピシクロンを含む農薬の総使用回数 : 3 回以内