

<p>チアクロプリド水和剤</p> <p>バリアード顆粒水和剤</p>	<p>取扱メーカー： バイエル、ホクサン</p> <p>原体メーカー： バイエル</p>
<p>成分：チアクロプリド〔ネオニコチノイド系〕……………30.0%</p>	<p>性状：褐色水和性細粒</p> <p>毒性：劇物</p> <p>消防法：——</p>

【品目特性】

●ネオニコチノイド系の殺虫剤で、果樹のシンクイムシ類やハモグリガなどのチョウ目害虫と吸汁性害虫など、広範囲の害虫に対して高い効果がある。

●ミツバチ、マルハナバチに対して影響が少なく、施設栽培の果菜類（いちご、トマト）などにも使いやすい。

●優れた浸透移行性，残効性を有しているので，作物全体を害虫の被害から守る。

●顆粒状の製剤で粉立ちせず非常に溶けやすい。

●有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【薬効・薬害等の注意】

●適用作物（ネクタリン、すもも及びあんず）への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

●共通注意事項 8. 適用作物群に関する注意事項を参照。

【安全対策上の注意】

●甲殻類に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないように注意する。

● 散布器具・容器の洗浄水は河川等に流さない。
また、空容器、空袋等は適切に処理する。



【適用と使用法】

作物名	適用品名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	チアクロプリドを含む農薬の総使用回数
りんご	カメムシ類 リンゴワタムシ	2000 倍	200 ～ 700 ℓ	前日まで	3 回以内	散布	3 回以内
	アブラムシ類	4000 倍					
	シンクイムシ類	2000 ～ 4000 倍					
	キンモンホソガ ギンモンハモグリガ コナカイガラムシ類	4000 倍					
	アブラムシ類 シンクイムシ類	2000 ～ 4000 倍					
なし	クワコナカイガラムシ カメムシ類	4000 倍 2000 倍		3 日前まで	2 回以内		2 回以内
	アブラムシ類	2000 ～ 4000 倍					
	シンクイムシ類 モモハモグリガ	4000 倍					
もも	アブラムシ類	2000 ～ 4000 倍		前日まで	2 回以内		2 回以内
ネクタリン	シンクイムシ類 モモハモグリガ	4000 倍					
小粒核果類 (うめ、すももを除く)	アブラムシ類	2000 ～ 4000 倍					
すもも	シンクイムシ類	4000 倍	前日まで	2 回以内	2 回以内		
	モモノゴマダラノメイガ アブラムシ類	2000 ～ 4000 倍					

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	チアクロプリドを含 む農薬の総使用回数					
う め	アブラムシ類	2000～4000倍	200～ 700 ℓ		2 回以内	散布						
	アカマダラケシキスイ シンクイムシ類	4000 倍										
おうとう	ウメシロカイガラムシ	2000 倍						前日まで	3 回以内	3 回以内		
	オウトウショウジョウバエ											
か き	カキノヘタムシガ アザミウマ類 コナカイガラムシ類		100～ 300 ℓ									
	ウリノメイガ											
メ ロ ン	アブラムシ類	4000 倍			2000～4000倍							
	ミナミキイロアザミウマ コナジラミ類	2000～4000倍										
い ち ご	アブラムシ類	2000 倍										
	コナジラミ類											
ぶ ど う	チャノキイロアザミウマ コナカイガラムシ類	4000 倍	200～ 700 ℓ	21 日前まで	2 回以内	2 回以内						
す い か ピーマン	アブラムシ類	2000～4000倍	100～ 300 ℓ	前日まで	3 回以内	3 回以内						
		とうがらし類					4000 倍					
な す ト マ ト	アブラムシ類 コナジラミ類	2000～4000倍					7 日前まで					
		4000 倍										
ミニトマト	アブラムシ類	2000～4000倍			前日まで							
		ウリノメイガ										
きゅうり	アブラムシ類	2000～4000倍			21 日前まで							
ばれいしょ	ウリノメイガ	2000 倍										
ズッキーニ	アブラムシ類	4000 倍										
こまつな												
茶	チャノミドリヒメヨコバイ チャノキイロアザミウマ チャノホソガ コミカンアブラムシ	2000～4000倍	200～ 400 ℓ	摘採 7 日前まで	1 回	1 回						
	マダラカサハラハムシ	2000 倍										