

<b>シアントラニプロール・チアジニル粒剤</b> <b>バイゲットパディート粒剤</b>	<b>取扱メーカー：</b> 日農 <b>原体メーカー：</b> FMC, 日農
<b>成分：</b> シアントラニプロール〔アントラニリックジアミド系〕…0.75% チアジニル……………12.0%	<b>性状：</b> 類白色細粒 <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> ——

### 【適用と使用法】 .....

作物名	適用病害虫名	1箱*当り 使用量	使用時期	使用方法	総使用回数
稲	いもち病 イネドロオイムシ	1kg/10a	移植時	側条施用	本剤 1回 シアントラニプロール 1回 チアジニル 3回以内 (直播では種時又は移植 時までの処理は1回以内, 本田での散布は2回以内)
稲 (箱育苗)	いもち病 白葉枯病 もみ枯細菌病 イネミズゾウムシ イネドロオイムシ ニカメイチュウ ツマグロヨコバイ イネヒメハモグリバエ フタオビコヤガ コブノメイガ イナゴ類	50 g	緑化期～ 移植当日	本剤の所定量 を育苗箱の上 から均一に散 布する。	本剤 1回 シアントラニプロール 1回 チアジニル 3回以内 (移植時までの処理は1回 以内, 本田での散布は2回 以内)
	イネツトムシ ヒメトビウンカ		移植3日前 ～移植当日		
直播水稲	いもち病 イネミズゾウムシ イネドロオイムシ	1kg/10a	は種時	は種同時施薬 機を用いて土 中施用する。	本剤 1回 シアントラニプロール 1回 チアジニル 3回以内 (は種時までの処理は1回 以内, 本田での散布は2回 以内)

\* 育苗箱は30×60×3cm, 使用土壌約5ℓ