

ピラゾスルフロンエチル・フェントラザミド・ベンゾビシクロン剤 ダブルスター SB (1キロ粒剤 / ジャンボ / 顆粒)	取扱メーカー： 日産 原体メーカー： 日産、バイエル、 エス・ディー・エス
成分： ピラゾスルフロンエチル〔スルホニルウレア系〕 ……0.30% (粒剤), 0.70% (ジャンボ), 2.6% (顆粒) フェントラザミド〔テトラゾリノン系 PRTR・1種〕 ……3.0% (粒剤), 6.7% (ジャンボ), 25.0% (顆粒) ベンゾビシクロン〔ビシクロオクタン系〕 ……2.0% (粒剤), 6.7% (ジャンボ), 25.0% (顆粒)	性状： 淡灰色細粒 (粒剤) 淡褐色細粒, 水溶性パック入り 1パック30g (ジャンボ) 淡褐色水和性細粒 (顆粒) 毒性： 普通物 消法： ——

【品目特性】…………… 〈共通〉

- 水田一年生雑草から多年生雑草まで高い効果を示す。
- ホタルイ、コナギ、アゼナ類等の問題雑草に効果が高い。
- 移植水稻に対して優れた選択性を示し、通常の使用方法では薬害の心配が少ない。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】…………… 〈共通〉

- 共通注意事項の5. 水稻除草剤散布 使用上のポイントを参照。
- 雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの2.5葉期までに時期を失ないように散布する。
- 多年生雑草は生育段階によって効果にフレが出るので、必ず適期に散布するように注意する。

雑草名	散布適期		
	粒剤	ジャンボ	顆粒
ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヘラオモダカ	2葉期まで		
オモダカ クログワイ	発生始期まで		
ヒルムシロ	発生期まで		
セリ	再生始期まで		
アオミドロ・藻類 による表層はく離	発生前		

- オモダカ、クログワイに対しては、有効な後処理剤との体系で使用する。有効な後処理剤と組み合わせて連年施用することにより、さらに効果が向上する。

- 直播水稻に使用する場合は、薬害をさけるため稲の1葉期以降に使用し、稲の根が露出している時の使用はさける。

- 移植前に生育したミズガヤツリには効果が劣るので、物理的防除方法などを用いて移植前に防除してから使用する。

〈ジャンボ〉

- 小包装 (パック) のまま10 a 当り10個の割合で水田に均等に投げ入れる。

- 散布時は圃場の水深を5 cm以上にして実施する。

〈顆粒〉

- 薬液の調製 (希釈) は散布当日に行う。

- 水口施用の場合は顆粒のまま顆粒水口施用専用袋を使用して水口に施用し、流入水とともに水田全面に拡散させる。施用後田面水が通常の湛水状態 (水深3～5 cm) に達した時に必ず水を止め田面水があふれ出ないように注意し、施用後7日間は落水、かけ流しはしない。

【薬効・薬害等の注意】…………… 〈共通〉

- 共通注意事項の5. 水稻除草剤散布 薬効・薬害等の注意を参照。

- 適用作物 (水稻) の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

- 適用外作物 (いぐさ、れんこん、せり、くわい) への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

【安全対策上の注意】

〈共通〉

- 藻類に影響を及ぼすので、使用時並びに使用後も注意。
- 散布器具・容器の洗浄水及び空容器は適切に処理する。

〈顆粒〉

- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にかからないようにする。
- 無人航空機滴下の際は、共通注意事項の2. 空中散布及び無人航空機（無人ヘリコプター等）による散布・滴下に関する注意事項を参照。

〈粒剤・顆粒〉



【適用と使用法】

①ダブルスター SB 1キログラム粒剤

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稻	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヘラオモダカ オモダカ クログワイ ヒルムシロ セリ アオミドロ・藻類に よる表層はく離	移植時	1 kg	田植同時散布機 で施用	1 回 ※
		移植直後～ ノビエ2.5葉期 但し、移植後30日 まで			
直播水稻	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ セリ	稲1葉期～ ノビエ2.5葉期 但し、収穫90日前 まで		湛水散布	

※ピラゾスルフロンエチルを含む農薬の総使用回数：1回
 ※フェントラザミドを含む農薬の総使用回数：1回
 ※ベンゾピシクロンを含む農薬の総使用回数：3回以内

②ダブルスター SB ジャンボ

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稻	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヘラオモダカ オモダカ クログワイ ヒルムシロ セリ アオミドロ・藻類による 表層はく離	移植後 1 日～ ノビエ 2.5 葉期 但し、移植後 30 日 まで	小包装 (パック) 10 個 300g	水田に小包装 (パック) の まま投げ入れる。	1 回 ※
直播水稻	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ セリ	稲 1 葉期～ ノビエ 2.5 葉期 但し、収穫 90 日前 まで			

※ピラゾスルフロンエチルを含む農薬の総使用回数：1 回

※フェントラザミドを含む農薬の総使用回数：1 回

※ベンゾピシクロンを含む農薬の総使用回数：3 回以内

③ダブルスター SB 顆粒

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り使用量		使用方法	本剤の 使用回数
			薬量	希釈水量		
移植水稻	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヘラオモダカ ヒルムシロ セリ オモダカ クログワイ アオミドロ・藻類による 表層はく離	移植時	80 g	500 ml	田植同時散布機で施用	1 回 ※
		移植直後～ ノビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで			湛水散布又は無人航空機による滴下	
		—		顆粒水口施用		
直播水稻	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ	稲 1 葉期～ ノビエ2.5葉期 但し、収穫90日前まで	80 g	500 ml	湛水散布	1 回 ※
				—	顆粒水口施用	

※ピラゾスルフロンエチルを含む農薬の総使用回数：1 回

※フェントラザミドを含む農薬の総使用回数：1 回

※ベンゾピシクロンを含む農薬の総使用回数：3 回以内