

ダブルストッパー

成分：クロルピクリン〔PRTR・1種〕……35.0%

1,3-ジクロロプロベン〔PRTR・1種〕……60.0%

毒性：劇物

【適用と使用方法】

作物名	適用病害虫名	10 a 当り 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	クロルピクリンを含む 農薬の総使用回数	D-D を含む農薬 の総使用回数
かぶだいこん	萎黄病 ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ	30 ℓ (1 穴当り 3 ml)	作付の 10 ～ 15 日前 まで	1 回	土壌くん蒸 (30×30 cm ごとの深さ 15 cm の 穴 に 1 穴 処 理 する。)	1 回	1 回
こまつな						2 回以内 (床土 1 回 以内)	
セルリー						3 回以内 (床土 1 回 以内、 圃場 2 回以内)	
かんしょ	立枯病 つる割病 ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ					1 回	
オクラ	立枯病 ネコブセンチュウ ネグサレセンチュウ						
なす	半身萎凋病 青枯病 半枯病 ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ					2 回以内 (床土 1 回 以内)	
トマト ミニトマト	萎凋病 根腐萎凋病 ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ						
ピーマン	青枯病 萎凋病 ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ					3 回以内 (床土 1 回 以内、 圃場 2 回以内)	
とうがらし類 ねぎ	萎凋病 ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ						
いちご	萎黄病 炭疽病 ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ						
きゅうり すいか	つる割病 ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ						
にがうり	ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ						

作物名	適用病害虫名	10 a 当り 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	クロルピクリンを含 む農薬の総使用回数	D-D を含む農薬 の総使用回数
に ん じ ん	しみ腐病 萎凋病 黒しみ病 ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ	30 ℓ (1 穴当 り 3 ml)	作付の 10 ～ 15 日前 まで	1 回	土壌くん蒸 (30×30 cm ごとの深さ 15cm の 穴 に1穴処理 する。)	1 回	1 回
ほうれんそう	萎凋病 ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ					2回以内 (床土1回 以内)	
メ ロ ン	黒点根腐病 えそ斑点病 つる割病 ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ					2回以内 (床土1回 以内、圃場 1回以内)	
し ょ う が	根茎腐敗病 立枯病 ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ					2回以内 (床土1回 以内)	
みょうが(花穂) みょうが(茎葉)	ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ					1 回	
は く さ い か ぼ ち や							
レ タ ス 非結球レタス	根腐病 ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ						
ばれいしょ	萎凋病 そうか病 ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ					1 回	
やまのいも	褐色腐敗病 ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ					2回以内 (床土1回 以内)	
ご ぼ う	黒あざ病 萎凋病 ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ						
こんにやく さ い も	乾腐病 ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ					1 回	
き く	半身萎凋病 萎凋病 ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ					3回以内 (床土1回 以内、圃場 2回以内)	
花 き 類・ 観 葉 植 物 (きくを除く)	萎黄病(フザリウム菌) 萎凋病(フザリウム菌) 株枯病(フザリウム菌) 乾腐病(フザリウム菌) 球根腐敗病(フザリウム菌) 立枯病(フザリウム菌) 葉枯病(フザリウム菌) 腐敗病(フザリウム菌) ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ						

〔取扱メーカー〕 日本化薬