

<b>イマズスルフロン・オキサジクロメホン・ピラクロニル・プロモブチド剤</b> <b>デルタアタック</b> <b>(1キロ粒剤 / ジャンボ / フロアブル)</b>	<b>取扱メーカー：</b> 協友アグリ* <b>原体メーカー：</b> 住友化学，全農，協友アグリ， 住友化学
<b>成分：</b> イマズスルフロン〔スルホニルウレア系〕 ……0.9% (粒剤)，2.25% (ジャンボ)，1.7% (フロアブル) オキサジクロメホン〔オキサジノン系〕 ……0.4% (粒剤)，0.75% (ジャンボ)，0.56% (フロアブル) ピラクロニル ……2.0% (粒剤)，5.0% (ジャンボ)，3.7% (フロアブル) プロモブチド〔酸アミド系〕 ……9.0% (粒剤)，22.5% (ジャンボ)，16.3% (フロアブル)	<b>性状：</b> 類白色細粒 (粒剤) 淡褐色粒状，水溶性パック入り1パック40g (ジャンボ) 類白色水和性粘稠懸濁液体 (フロアブル) <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> —

## 【品目特性】…………… 〈共通〉

- ノビエを始めとして一年生雑草，多年生雑草まで幅広く，優れた効果を持つ。
- スルホニルウレア抵抗性雑草にも高い効果を示す。
- 効果の発現が非常に速く，長期間持続する。
- 温度による効果の変動が少ない。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

### 〈粒剤・フロアブル〉

- 田植同時処理が可能である。

### 〈ジャンボ〉

- 移植直後処理が可能である。

## 【使用上のポイント】…………… 〈共通〉

- 共通注意事項の5．水稻除草剤散布 使用上のポイントを参照。
- ノビエの2.5葉期までに時期を失ないように散布する。
- 多年生雑草は生育段階によって効果にフレが出るので必ず適期に散布する。

雑草名	散布適期		
	粒剤	ジャンボ	フロアブル
ミズガヤツリ	3葉期まで (但し、直播 水稻は2葉 期まで)	2葉期まで	3葉期まで (但し、直播 水稻は2葉 期まで)
ホタルイ			2葉期まで
へらオモダカ	2葉期まで		
ウリカワ	2葉期まで (但し、直播 水稻は発生 始期まで)		
エゾノサヤヌカガサ	—		
ヒルムシロ	発生期まで		
セリ	再生前～再生始期まで		再生前～再生始期まで (但し、直播 水稻は発生 前まで)
オモダカ クログワイ	発生前～発生始期まで		
コウキヤガラ	発生始期まで		
シズイ	草丈3cmまで		
アオミドロ・藻類 による表層はく離	発生前	—	

## 【薬効・薬害等の注意】…………… 〈共通〉

- 共通注意事項の5．水稻除草剤散布 薬効・薬害等の注意を参照。
- いぐさ栽培予定田では使用しない。また，本剤散布後の田面水を他作物に灌水しない。
- 適用作物 (水稻) への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。
- 適用外作物 (いぐさ，れんこん，せり，くわい) への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

●直播水稻栽培では、稲の根が露出する条件では葉害を生じるおそれがあるので注意する。

## 【安全対策上の注意】 .....

### 〈共通〉

●藻類に影響を及ぼすので、使用時並びに使用後も注意する。

### 〈粒剤〉

●無人ヘリコプター散布の際は、共通注意事項の2. 空中散布及び無人航空機（無人ヘリコプター等）による散布・滴下に関する注意事項を参照。

●蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。

### 〈フロアブル〉

●無人航空機滴下の際は、共通注意事項の2. 空中散布及び無人航空機（無人ヘリコプター等）による散布・滴下に関する注意事項を参照。

●蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。

## 【適用と使用法】 .....

### ①デルタアタック 1 キロ粒剤

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ウリカワ ミズガヤツリ ヒルムシロ セリ	移植時	1kg	田植同時散布機で施用	1 回 ※
	オモダカ クログワイ コウキヤガラ シズイ アオミドロ・藻類による表層はく離	移植直後～ ノビエ 2.5 葉期 但し、 移植後 30 日まで		湛水散布 又は無人ヘリコプターによる散布	
直播水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヒルムシロ セリ	稲 1 葉期～ ノビエ 2.5 葉期 但し、 収穫 90 日前まで			

※イマゾスルフロンを含む農薬の総使用回数 : 2 回以内

※オキサジクロメホンを含む農薬の総使用回数 : 2 回以内

※ピラクロニルを含む農薬の総使用回数 : 2 回以内

※プロモブチドを含む農薬の総使用回数 : 2 回以内

## ②デルタアタックジャンボ

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ウリカワ ミズガヤツリ ヒルムシロ セリ オモダカ クログワイ コウキヤガラ シズイ	移植直後～ ノビエ2.5葉期 但し、 移植後30日まで	小包装 (パック) 10個 (400g)	水田に小包装(パック)のまま投げ入れる。	1回 ※
直播水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ セリ	稲1葉期～ ノビエ2.5葉期 但し、 収穫90日前まで			

※イマゾスルフロンを含む農薬の総使用回数：2回以内

※オキサジクロメホンを含む農薬の総使用回数：2回以内

※ピラクロニルを含む農薬の総使用回数：2回以内

※プロモブチドを含む農薬の総使用回数：2回以内

## ③デルタアタックフロアブル

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ウリカワ ミズガヤツリ ヒルムシロ セリ エゾノサヤヌカグサ オモダカ クログワイ コウキヤガラ シズイ	移植時	500 ml	田植同時散布機で施用	1回 ※
		移植直後～ ノビエ2.5葉期 但し、 移植後30日まで		原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下	
直播水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ウリカワ ミズガヤツリ ヒルムシロ セリ	稲1葉期～ ノビエ2.5葉期 但し、 収穫90日前まで		原液湛水散布又は無人航空機による滴下	

※イマゾスルフロンを含む農薬の総使用回数：2回以内

※オキサジクロメホンを含む農薬の総使用回数：2回以内

※ピラクロニルを含む農薬の総使用回数：2回以内

※プロモブチドを含む農薬の総使用回数：2回以内