



作物名	適用病害名	希釈 倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	チウラムを含む 農薬の総使用回数
りんご	斑点落葉病 黒星病 黒点病 褐斑病 すす点病 すす斑病 赤星病 炭疽病 輪紋病	500 倍	200～ 700 ℓ	30 日前まで	5 回以内	散布	5 回以内
なし	黒斑病 黒星病 赤星病 心腐れ症(胴枯病菌) 炭疽病 褐色斑点病						5 回以内 (休眠期は 1 回以内)

作物名	適用病害名	希釈 倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	チウラムを含む 農薬の総使用回数
も も	黒星病 灰星病	500倍	200～ 700 ℓ	7日前まで	5回以内	散布	5回以内
ネクタリン	縮葉病 せん孔細菌病			30日前まで			
か き	落葉病 炭疽病 うどんこ病				14日前まで		3回以内
す も も	ふくろみ病 炭疽病			21日前まで			
あ ん ず	かいよう病				5回以内		5回以内
う め	黒星病			5回以内			
おうとう	褐色せん孔病 炭疽病 灰星病 幼果菌核病	1000倍	60日前まで		2回以内	3回以内 (休眠期は1回以内、 生育期は2回以内)	
ぶ ど う	晩腐病 べと病 灰色かび病 褐斑病 黒とう病			500倍			100～ 300 ℓ
い ち ご	炭疽病	生育期 但し、 収穫開始 21日前まで	2回以内				
りんどう	褐斑病 葉枯病 炭疽病 灰色かび病	100～ 500 ℓ	発病初期		6回以内	6回以内	
花き類・ 観葉植物 (りんどうを除く)	灰色かび病 炭疽病						