#### 

#### 

- ●水稲の広範な害虫に効果を発揮する。特にウンカ類・カメムシ類に対しては殺虫効果のほかに特異な忌避作用を示す。
- ●小麦,豆類 (種実),えだまめ,やまのいも,かんしょ,とうもろこし,キャベツ,れんこんに使用できるほか,休耕田のカメムシ防除にも活用できる粉剤。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一 覧表」を参照。

## 【使用上のポイント】…………

●イネミズゾウムシ成虫は、移動範囲が広いのでなるべく広域で一斉に防除し、畦畔など周辺雑草にも散布する。

### 

- ●眼に入らないよう注意。眼に入った場合は直ち に水洗する (弱い刺激性)。
- 魚類に影響を及ぼすので、養魚田では使用しない。
- ●冷水魚,甲殻類に影響を及ぼすので,河川,養殖池等に飛散,流入しないよう注意して使用する。 養殖池等の周辺での使用はさける。
- ●共通注意事項7. ミツバチに対する注意事項を 参昭。









# 

作物名	適用場所	適用害虫名	10 a 当り 使用量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	エトフェンプロックスを 含む農薬の総使用回数
		イネツトムシ	4 kg				
稲		カメムシ類 イネミズゾウムシ成虫 ツマグロ類 コブノメイガ アザミウ類 イナゴ質 イネドコロオイムシ ニカメイチュウ イネヒメハモグリバエ	3 ~ 4 kg	7日前まで	3回以内		3 回以内
		フタオビコヤガ	3 kg				
小 麦		ヒメトビウンカ アブラムシ類 ハスモンヨトウ					
豆 類 (種実)		マメシンクイガ シロイチモジマダラメイガ カメムシ類 フタスジヒメハムシ ダイズサヤタマバエ アブラムシ類 アズキノメイガ	4 kg	14日前まで	2回以内		2回以内
		ハスモンヨトウ	$3 \sim 4 \text{ kg}$				
えだまめ	_	マメシンクイガ シロイチモジマダラメイガ カメムシ類 フタスジヒメハムシ ダイズサヤタマバエ				散布	
やまのいも		シロイチモジヨトウ	4 kg				
さといも ばれいしょ		ハスモンヨトウ テントウムシダマシ類			3回以内		3回以内
かんしょ		ハスモンヨトウ ナカジロシタバ		7日前まで			
とうもろこし		アワノメイガ			4回以内		4回以内
きゅうり な す		ウリハムシ テントウムシダマシ類	3∼4kg	前日まで			
すいか		ハスモンヨトウウリハムシ	4kg				
キャベツ		ハスモンヨトウ アブラムシ類 アオムシ	3∼4kg	3日前まで			
はくさい		アオムシコナガ	4kg	7日前まで	9 ज्ञास्त्र स		9屆시관
だいこん		アオムシ ダイコンサルハムシ	3~4kg	21日前まで	3回以内		3回以内
れんこん		マメコガネ	4kg	14日前まで			
水田作物 畑 作 物 (休耕田)	ヨシ,オギ,ス スキ,セイタ カアワダチソ ウ等の多年生 雑草が優占し ている休耕田	カメムシ類	3 ~ 4 kg				