

チアジニル粒剤 バイゲット箱粒剤	取扱メーカー： 日農 原体メーカー： 日農
成分： チアジニル……………12.0%	性状： 類白色細粒 毒性： 普通物 消防法： ——

【品目特性】……………

- いもち病、もみ枯細菌病、白葉枯病に有効である。
- 浸透移行性に優れ、箱処理により長期間に渡り高い防除効果が持続する。
- 緑化期から移植当日まで幅広い使用が可能である。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- 稲の葉が露で濡れている場合には、散布前に露を払い落としておく。
- 育苗箱の上から所定量を均一に散布し、苗に付着した薬剤は払い落とし、軽く散水して田植機で移植する。

【薬効・薬害等の注意】……………

- 軟弱徒長苗、ムレ苗又は苗の生育が不良な場合には、薬害を生じるおそれがあるので注意する。
- 本田の整地が不均整な場合は、薬害を生じるおそれがあるので、代かきは丁寧に行い、移植後に田面が露出しないように注意する。
- きく等の他作物に影響を及ぼす場合があるので、薬剤が育苗箱からこぼれ落ちないように散布する。

【安全対策上の注意】……………

- 眼に対して刺激性がある。
- 魚類に影響を及ぼすので、使用時は注意。

【適用と使用法】……………

作物名	適用病害名	1箱*当り 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	チアジニルを含む 農薬の総使用回数
稲 (育苗箱)	いもち病 もみ枯細菌病 白葉枯病 穂枯れ(ごま葉枯病菌)	50g	緑化期～ 移植当日	1回	育苗箱中の 苗の上から 均一に散布 する	3回以内 (育苗箱散布及び 側条施用は合計1 回以内、本田での 散布は2回以内)
	内穎褐変病		移植当日			

* 育苗箱は30×60×3cm、使用土壌約5ℓ