

フラメトピル水和剤 リンバー顆粒水和剤	取扱メーカー： 北興＊，住友化学＊ 原体メーカー： 住友化学
成分： フラメトピル〔酸アミド系〕……………50.0% その他 PRTR 該当成分： ドデシル硫酸ナトリウム〔PRTR・1種〕……………4.0%	性状： 類白色水和性細粒 毒性： 普通物 消防法： —

【品目特性】……………

- リゾクトニア属菌に強力な活性を有するてんさい専用の殺菌剤である。
- 優れた予防効果と治療効果を示す。
- 浸透移行性を有し、残効性、耐雨性を備える。
- 薬液調製しやすい顆粒水和剤である。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- 発病初期までの予防効果が最も効果的である。

【安全対策上の注意】……………



【適用と使用方法】……………

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	フラメトピルを含む 農薬の総使用回数
ばれいしょ	黒あざ病	1000倍	—	植付前	1回	瞬間～10分間 種いも浸漬	1回
ねぎ	白絹病	4000倍	100～300ℓ /10a	前日まで	3回以内	株元散布	3回以内
てんさい	根腐病	800倍	1ℓ / ペーパー ポット1冊	定植前	1回	灌注	4回以内 (定植前の灌注 は1回以内、散 布は3回以内)
	葉腐病	4000倍	100～300ℓ /10a	7日前まで	3回以内	散布	