

| | |
|--|---|
| テフリルトリオン・ピラクロニル・モリネート粒剤 イッソウ1キロ粒剤 | 取扱メーカー： 協友アグリ 原体メーカー： 全農・バイエル・北興、協友アグリ、 協友アグリ |
| 成分： テフリルトリオン〔トリケトン系〕……………3.0% ピラクロニル……………2.0% モリネート〔カーバメート系 PRTR・I 種〕……………24.0% | 性状： 淡褐色細粒 毒性： 普通物 消防法： — |

【品目特性】……………

- 高葉齢のノビエ（4葉期まで）に高い効果を発揮する。
- スルホニルウレア（SU）抵抗性雑草及び多年生難防除雑草まで幅広く優れた効果を示す。
- 速効的な効果発現が認められる。
- 水稲に対する安全性が高く、幅広い散布時期を持つ。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- 共通注意事項の5. 水稲除草剤散布 使用上のポイントを参照。
- ノビエの4葉期までに散布する。
- 多年生雑草は生育段階によって効果にフレがあるので、必ず適期に散布する。
- 移植水稲栽培では前処理剤との体系で使用し、雑草の発生状況をよく確認し、時期を失しないように散布する。

| 雑草名 | 散布適期 |
|--------|------------------------------|
| ミズガヤツリ | 6葉期まで (但し、直播水稲は3葉期まで) |
| ホタルイ | 花茎10cm まで (但し、直播水稲は4葉期まで) |
| ウリカワ | 5葉期まで (但し、直播水稲は3葉期まで) |
| ヘラオモダカ | 4葉期まで |
| ヒルムシロ | 発生盛期まで |
| オモダカ | 矢じり葉3葉期まで |
| クログワイ | 草丈10cm まで |
| シズイ | 草丈20cm まで |

【薬効・薬害等の注意】……………

- 直播水稲栽培では、稲の根が露出する条件では薬害を生じるおそれがあるので注意する。
- 共通注意事項の5. 水稲除草剤散布 薬効・薬害等の注意を参照。
- 適用作物（水稲）及び適用外作物（畑作物、きゅうり、いぐさ、れんこん、せり、くわい等）への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

【安全対策上の注意】……………

- 無人航空機散布の際は、共通注意事項の2. 空中散布及び無人航空機（無人ヘリコプター等）による散布・滴下に関する注意事項を参照。
- 魚類に影響を及ぼすので、養魚田では使用しない。
- 藻類に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用する。
- 眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。
- 皮膚に対して刺激性があるので、付着しないように注意。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とす。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。



【適用と使用法】

| 作物名 | 適用雑草名 | 使用時期 | 10a 当り 使用量 | 使用方法 | 本剤の 使用回数 |
|------|--|--------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------|
| 移植水稻 | 水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ウリカワ ミズガヤツリ オモダカ クログワイ シズイ ヒルムシロ | 移植後10日～ ノビエ4葉期 但し、 収穫60日前まで | 1kg | 湛水散布又は 無人航空機による 散布 | 1回 ※ |
| 直播水稻 | 水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヒルムシロ | 稲1葉期～ ノビエ4葉期 但し、 収穫60日前まで | | | |

※テフリトリオンを含む農薬の総使用回数：2回以内
 ※ピラクロニルを含む農薬の総使用回数：2回以内
 ※モリネートを含む農薬の総使用回数：1回