

ジフルフェニカン・トリフルラリン乳剤 ガレース乳剤	取扱メーカー： バイエル 原体メーカー： バイエル、ゴーワン
成分： ジフルフェニカン〔ニコチンアニリド系〕……………3.7% トリフルラリン〔ジニトロアニリン系 PRTR・1種〕…37.0% その他 PRTR 該当成分： キシレン〔PRTR・1種〕……………8.7% 〈6.6～10.8%〉 エチルベンゼン〔PRTR・1種〕……………10.3% 〈8.2～12.3%〉	性状： 赤色澄明可乳化油状液体 毒性： 普通物 消防法： 第4類・第2石油類（非水溶性）・危険等級III

【品目特性】……………

- ガレースGの項参照。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- ガレースGの項参照。

【薬効・薬害等の注意】……………

- ガレースGの項参照。

【安全対策上の注意】……………

- 自動車などに散布液がかかると変色するおそれがあるので散布液がかからないように注意する。（塗装汚染）
- ガレースGの項参照。
- 藻類に影響を及ぼすおそれがあるので、使用時は注意。
- 散布器具・容器の洗浄水及び空容器は適切に処理する。



【適用と使用法】……………

作物名	適用 雑草名	適用 土壌	使用時期	10 a 当り使用量		適用 地帯	本剤の 使用回数	使用 方法	ジフルフェニカンを含む農業の総使用回数	トリフルラリンを含む農業の総使用回数
				薬量	希釈水量					
小 麦 一年生 雑草		全土壌 (砂土を除く)	は種後出芽前 (雑草発生前)	200～ 250 ml	100 ℓ	全域	1 回	全面土 壌散布	1 回	2 回 以内
			出芽後出芽揃 まで (雑草発生前 ～発生始期)	150～ 250 ml		北海道		雑草茎 葉散布 又は全 面土壌 散布		
			小麦1～3葉期 (雑草発生前～ 発生始期)	100～ 150 ml						
大 麦 (秋播 栽培)			は種後出芽前 (雑草発生前)	200～ 250 ml		全域 (北海道 を除く)		全面土 壌散布		