

<b>イソフェタミド水和剤</b> <b>ケンジャフロアブル</b>	<b>取扱メーカー：</b> 石原  <b>原体メーカー：</b> 石原産業
<b>成分：</b> イソフェタミド……………36.0%	<b>性状：</b> 類白色水和性粘稠懸濁液体 <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> ——

### 【品目特性】……………

- 病原菌の生活環の多くのステージに作用することが明らかになっている。特に感染前（胞子発芽～付着器形成）に高い防除効果を発揮することから予防的散布で優れた防除効果が期待できる。
- 胞子形成を阻害する効果もあるため、発生初期の散布になった場合も圃場や施設内の菌密度を大きく低下させる。
- 既存薬剤に感受性が低下した病原菌に対しても卓効を示す。
- 浸達性に優れ、高い耐雨性、残効性を示すことから圃場での効果が安定する。
- 有用生物、天敵生物への影響が少なく IPM に適する。

### 【使用上のポイント】……………

- 使用直前に、容器をよく振る。
- できるだけ発病前または発病初期に散布する。
- 薬剤耐性菌の出現を防ぐため本剤の過度な連用はさけ、作用性の異なる薬剤と組み合わせて輪番で使用する。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

### 【薬効・薬害等の注意】……………

- 使用液量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせて調製する。
- ぶどうに使用する場合、果粒だいず粒大期から袋かけ前までの散布は、果粉の溶脱及び果実に汚れを生じるおそれがあるので、十分に注意する。
- 共通注意事項 8、適用作物群に関する注意事項を参照。

【適用と使用方法】 .....

作物名	適用病害名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	イソフエタミドを含む 農薬の総使用回数
か ん き つ	灰色かび病 黒点病 そうか病	1500倍	200～ 700 ℓ	7日前まで	3回以内	散布	3回以内
も も	灰星病	2000倍		前日まで			
う め	黒星病						
お う と う	灰星病						
ぶ ど う	黒とう病 灰色かび病 褐斑病 うどんこ病	1500倍	100～ 300 ℓ	7日前まで			
か き	うどんこ病 灰色かび病 落葉病	2000倍					
豆類(種実,但し, いんげんまめ, らっかせい を除く)	菌核病 灰色かび病	1500倍		14日前まで	2回以内		2回以内
いんげんまめ	菌核病 灰色かび病 炭疽病						
さやえんどう	灰色かび病						
き ゅ う り	菌核病 灰色かび病 褐斑病 うどんこ病 つる枯病	1000～ 1500倍		前日まで	4回以内		4回以内
メ ロ ン	つる枯病 うどんこ病	1500倍					
ト マ ト ミニトマト	葉かび病 うどんこ病 灰色かび病				3回以内		3回以内
な す	菌核病 うどんこ病 灰色かび病						
た ま ね ぎ	灰色かび病				1000～ 1500倍	3日前まで	4回以内
キ ャ ベ ツ	菌核病	1500倍		前日まで 14日前まで 前日まで	3回以内	3回以内	
レ タ ス	菌核病						
非結球レタス	灰色かび病						
い ち ご	灰色かび病						