

<b>トリアファモン・フェンキノトリオン・フェントラザミド剤</b> <b>カウントダウン</b> <b>(1キロ粒剤 / ジャンボ / フロアブル)</b>	<b>取扱メーカー：</b> バイエル  <b>原体メーカー：</b> バイエル, クミカ, バイエル
<b>成分：</b> トリアファモン〔スルホンアニリド系〕 ……0.5% (粒剤), 1.2% (ジャンボ), 0.95% (フロアブル) フェンキノトリオン〔トリケトン系〕 ……3.0% (粒剤), 7.5% (ジャンボ), 5.7% (フロアブル) フェントラザミド〔テトラゾリノン系 PRTR・1種〕 ……3.0% (粒剤), 7.5% (ジャンボ), 5.7% (フロアブル)	<b>性状：</b> 類白色細粒 (粒剤) 褐色細粒 水溶性パック入り 1パック40g(ジャンボ) 類白色水和性粘稠懸濁液体(フロアブル)  <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> —

## 【品目特性】…………… 〈共通〉

- 3成分の混合剤で、ほとんど全ての一年生雑草、多年生雑草に高い除草効果を示す一発処理除草剤。
  - ノビエに高い除草効果と長期の残効性を示す。特に高葉齢のノビエに有効。
  - クログワイ、オモダカ、コウキヤガラ等の難防除雑草に高い除草効果を示す。
  - スルホニルウレア抵抗性雑草や、イボクサ等の特殊雑草にも有効。
  - 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。
- 〈粒剤・フロアブル〉
- 水稲に対する高い安全性を有し、田植え同時散布が可能。

## 【使用上のポイント】…………… 〈共通〉

- 共通注意事項の5. 水稲除草剤散布 使用上のポイントを参照。
- 雑草の発生前から発生初期に有効なので、ノビエの3.5葉期(ジャンボの移植水稲は3葉期)までに、時機を失しないように散布する。
- 多年生雑草は必ず適期に散布するように注意する。

雑草名	散布適期		
	粒剤	ジャンボ	フロアブル
コナギ	3葉期		
ミズアオイ	3葉期	2葉期	3葉期
ホタルイ	4葉期	3葉期	4葉期
へらオモダカ	3葉期		
ミズガヤツリ	草丈15cm	5葉期	3葉期
ウリカワ	3葉期		
ヒルムシロ	発生期		
セリ	再生期	再生始期	再生期
コウキヤガラ	発生始期		
キシュウスズメノヒエ	再生茎3葉期		
エゾノサヤメカサ	3葉期		
シズイ	草丈3cm		

- クログワイ、オモダカは必要に応じて有効な後処理剤と組み合わせて使用する。

## 〈ジャンボ〉

- 小包装(パック)のまま10個/10aの割合で水田に均等に投げ入れる。

## 〈フロアブル〉

- 使用前に容器をよく振ってから使用する。

## 【薬効・薬害等の注意】…………… 〈共通〉

- 共通注意事項の5. 水稲除草剤散布 薬効・薬害等の注意を参照。
- 適用作物(水稲)への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。
- 適用外作物(いぐさ、れんこん、せり、くわい、なす、たまねぎ、さやえんどう)の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。
- 共通注意事項の8. 適用作物群に関する注意事項を参照。
- 薬害を生じるおそれがあるので、後作物としてなす、たまねぎ及びさやえんどうを栽培しない。

【安全対策上の注意】……………  
 〈共通〉

- 無人航空機散布の際は、共通注意事項の2、空中散布及び無人航空機（無人ヘリコプター等）による散布に関する注意事項を参照。
- 藻類に影響を及ぼすため使用時並びに使用後も注意する。

〈粒剤〉



〈フロアブル〉



【適用と使用法】……………

①カウントダウン1キロ粒剤

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稻	一年生雑草 多年生雑草	移植時	1 kg	田植同時散布機で 施用	1 回 ※
		移植直後～ ノビエ3.5葉期 但し、 移植後30日まで		湛水散布 又は 無人航空機による 散布	
直播水稻	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ セリ	稲1葉期～ ノビエ3.5葉期 但し、 収穫90日前まで			

※トリアファモンを含む農薬の総使用回数：2回以内  
 ※フェンキノトリオンを含む農薬の総使用回数：2回以内  
 ※フェントラザミドを含む農薬の総使用回数：1回

②カウントダウンジャンボ

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稻	一年生雑草 多年生雑草	移植直後～ ノビエ3葉期 但し、 移植後30日まで	小包装 (バック) 10 個 (400g)	水田に小包装 (バック) のま ま投げ入れる。	1 回 ※
直播水稻	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ セリ	稲1葉期～ ノビエ3.5葉期 但し、 収穫90日前まで			

※トリアファモンを含む農薬の総使用回数：2回以内  
 ※フェンキノトリオンを含む農薬の総使用回数：2回以内  
 ※フェントラザミドを含む農薬の総使用回数：1回

### ③カウントダウンフロアブル

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稻	一年生雑草 多年生雑草	移植時	500 ml	田植同時散布機で 施用	1 回 ※
		移植直後～ ノビエ 3.5 葉期 但し、 移植後 30 日まで		原液湛水散布、 水口施用 又は 無人航空機による 滴下	
直播水稻	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ セリ	稲 1 葉期～ ノビエ 3.5 葉期 但し、 収穫 90 日前まで		原液湛水散布 又は 無人航空機による 滴下	

※トリアファモンを含む農業の総使用回数 : 2 回以内

※フェンキノトリオンを含む農業の総使用回数 : 2 回以内

※フェントラザミドを含む農業の総使用回数 : 1 回