

トリシクラゾール・バリダマイシン水和剤 ビームバリダゾル	取扱メーカー： 協友アグリ、サンケイ＊、住友化学 原体メーカー： ダウ、住友化学
成分： トリシクラゾール……………20.0% バリダマイシンA〔抗生物質〕……………5.0%	性状： 淡黄赤色粘稠水和性懸濁液体 毒性： 劇物 消防法： ——

【品目特性】……………

- いもち病、紋枯病同時防除剤である。
- ビーム粉剤DL、バリダシン液剤5の項を参照。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- いもち病、紋枯病の防除適期が一致する時期に使用する。

【薬効・薬害等の注意】……………

- 適用外作物（なし、野菜類、きく）への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

【安全対策上の注意】……………

- 空中散布及び無人ヘリコプター散布の際は、共通注意事項の2. 空中散布及び無人航空機（無人ヘリコプター等）による散布・滴下に関する注意事項を参照。



【適用と使用法】……………

作物名	適用病害名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	トリシクラゾールを含む 農薬の総使用回数	バリダマイシンを含む 農薬の総使用回数
稲	いもち病 紋枯病	1000 倍	——	14 日前 まで	3 回以内	散布	4 回以内 (育苗箱への 処理は1回以 内、本田で は3回以内)	6 回以内 (育苗箱灌注 は1回以内、 本田では5 回以内)
		3 倍	300 ml			空中散布		
		30 倍	3 ℓ			無人ヘリコ プターによ る散布		
		8 倍	800 ml					