

テフリルトリオン・トリアファモン剤 ボデーガードプロ (1キロ粒剤 / ジャンボ / フロアブル)	取扱メーカー： バイエル 原体メーカー： 全農・バイエル・北興、バイエル
成分： テフリルトリオン〔トリケトン系〕 ……3.0% (粒剤), 10.0% (ジャンボ), 5.8% (フロアブル) トリアファモン〔スルホアニリド系〕 ……0.50% (粒剤), 1.6% (ジャンボ), 0.97% (フロアブル)	性状： 類白色細粒 (粒剤) 褐色細粒 水溶性パック入り 1パック30g (ジャンボ) 淡褐色水和性粘稠懸濁液体 (フロアブル) 毒性： 普通物 消防法： —

【品目特性】…………… 〈共通〉

●テフリルトリオンと新規成分トリアファモンの2種混合の一発処理除草剤である。

●ほとんど全ての一年生雑草、多年生雑草に高い効果を示し、高葉齢のノビエやクログワイ、オモダカ、コウキヤガラなどの多年生雑草に卓効である。

●スルホニルウレア抵抗性雑草やイボクサ、クサネムなどの特殊雑草にも有効である。

●約40～50日の残効を有し、通常の圃場条件では1回の散布で雑草防除ができる。

●水稻に対する選択性が高く、通常の圃場条件下では安心して使用できる (砂質土壌や漏水田での使用はさける)。

●直播水稻 (鉄コーティング直播栽培含む) において、効果・安全性ともに優れ、処理適期幅が広く余裕をもって散布できる。

●有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】…………… 〈共通〉

●共通注意事項の5. 水稻除草剤散布 使用上のポイントを参照。

〈粒剤〉

●雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの3.5葉期までに、時期を失ないように散布する。

〈ジャンボ〉

●雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの3葉期までに、時期を失ないように散布する。

●小包装 (パック) のまま10 a 当り10個の割合で水田に均等に投げ入れる。

〈フロアブル〉

●雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの3.5葉期までに、時期を失ないように散布する。

●使用前によく振ってから使用する。

〈移植水稻〉

雑草名	散布適期		
	粒剤	ジャンボ	フロアブル
ホタルイ	4葉期まで	3葉期まで	4葉期まで
へらオモダカ ミズガヤツリ	3葉期まで	4葉期まで	
ウリカワ	3葉期まで		
クログワイ	発生前～草丈 10cmまで	発生日期まで	発生前～草丈 10cmまで
オモダカ	発生前～へら 葉期まで	発生前～広 線形葉2葉 期まで	発生前～へら 葉期まで
ヒルムシロ	発生日期まで		
セリ	再生前～再生始期まで		
コウキヤガラ	発生日期～草 丈30cmまで	発生日期～草 丈25cmまで	発生日期～草 丈30cmまで
エゾノサヤヌカサ	3葉期まで	—	
キシュウスズメノヒエ	再生始まで	3葉期まで	再生茎 3葉期まで

〈直播水稻〉

雑草名	散布適期		
	粒剤	ジャンボ	フロアブル
ホタルイ	2葉期まで	3葉期まで	
ミズガヤツリ	3葉期まで		4葉期まで
ウリカワ	3葉期まで	2葉期まで	3葉期まで
ヒルムシロ	発生前期まで		
セリ	再生前～再生始期まで		

【薬効・薬害等の注意】

〈共通〉

- 共通注意事項の5. 水稻除草剤散布 薬効・薬害等の注意を参照。
- 適用作物（水稻）への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。
- 適用外作物（いぐさ、れんこん、せり、くわい、なす、たまねぎ、さやえんどう）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

【安全対策上の注意】

〈粒剤・フロアブル〉

- 無人航空機散布・滴下の際は、共通注意事項の2. 空中散布及び無人航空機（無人ヘリコプター等）による散布・滴下に関する注意事項を参照。

〈粒剤〉



〈フロアブル〉



【適用と使用法】

①ボデーガードプロ1キロ粒剤

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ ウリカワ クログワイ オモダカ ヒルムシロ セリ コウキヤガラ エゾノサヤヌカグサ シズイ キシユウスズメノヒエ	移植時	1 kg	田植同時散布機で施用	1 回 ※
		移植直後～ ノビエ 3.5 葉期 但し、 移植後 30 日まで		湛水散布又は無人航空機による散布	
直播水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ セリ	は種時		は種同時散布機で施用	
		は種直後～ ノビエ 3.5 葉期 但し、 収穫 90 日前まで		湛水散布又は無人航空機による散布	

※テフリルトリオンを含む農薬の総使用回数：2 回以内

※トリアファモンを含む農薬の総使用回数：2 回以内

②ボデーガードプロジャンボ

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ ウリカワ クログワイ オモダカ ヒルムシロ セリ コウキヤガラ キシウスズメノヒエ	移植後5日～ ノビエ 3 葉期 但し、 移植後30日まで	小包装 (パック) 10 個 (300g)	水田に小包装(パック)のまま投げ入れる。	1 回 ※
直播水稻	水田一年草雑草 マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ セリ	稲 1 葉期～ ノビエ3 葉期 但し、 収穫90日前まで			

※テフリトリオンを含む農薬の総使用回数：2回以内

※トリアファモンを含む農薬の総使用回数：2回以内

③ボデーガードプロフロアブル

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稻	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ ウリカワ クログワイ オモダカ ヒルムシロ セリ コウキヤガラ キシウスズメノヒエ	移植後5日～ ノビエ 3.5 葉期 但し、 移植後30日まで	500 ml	原液湛水散布， 水口施用 又は 無人航空機による 滴下	1 回 ※
直播水稻	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ	は種直後～ ノビエ3.5 葉期 但し、 収穫90日前まで			

※テフリトリオンを含む農薬の総使用回数：2回以内

※トリアファモンを含む農薬の総使用回数：2回以内