

|  |   |
|--|---|
| <b>銅水和剤</b><br><b>フジドーＬフロアブル</b>       | <b>取扱メーカー：</b><br>日農<br><br><b>原体メーカー：</b><br>——                |
| <b>成分：</b> 塩基性硫酸銅……………23.0%（銅として12.9%） | <b>性状：</b> 淡緑色水和性粘稠懸濁液体<br><br><b>毒性：</b> 普通物<br><b>消防法：</b> —— |

### 【品目特性】……………

- 希釈の簡単なフロアブル製剤の無機銅剤。
- フロアブル化により有効成分が作物に均一に付着し、安定した効果を示す。
- フロアブル化により付着性が増し、耐雨性に優れる。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

### 【使用上のポイント】……………

- 貯蔵中に分離することがあるので、使用に際しては容器をよく振る。

### 【薬効・薬害等の注意】……………

- 石灰硫黄合剤等アルカリ性薬剤との混用はさける。
- かんきつに使用する場合、薬害の発生するおそれがあるので、炭酸カルシウム水和剤を加用する。特に果実の着生時期及び雑柑への散布では厳守する。
- てんさいに使用する場合、高温時の散布は薬害を生じるおそれがあるのでさける。

- だいこんに使用する場合、次の事項に注意する。

- 幼苗期の散布又は過度の連用は、薬害を生じるおそれがあるのでさける。
- 薬害を生じるおそれがあるので、薬害軽減のために必ず炭酸カルシウム水和剤を加用する。但し、収穫間際には汚れを生じるので留意する。
- 病害発生後の散布では効果が劣るので、発生前から予防的に散布する。

- 共通注意事項 8. 適用作物群に関する注意事項を参照。

### 【安全対策上の注意】……………

- 魚類に影響を及ぼすおそれがあるので、使用時は注意。
- 散布器具・容器の洗浄水及び空容器は適切に処理する。

【適用と使用法】 .....

| 作物名                   | 適用病害名                                       | 希釈倍数           | 10 a 当り<br>使用液量 | 使用時期           | 本剤の<br>使用回数 | 使用方法 | 銅を含む農薬<br>の総使用回数 |
|-----------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-------------|------|------------------|
| かんきつ                  | そうか病  | 500倍           | 200 ～<br>700 ℓ  | ――             | ――          | 散布   | ――               |
| うめ                    | かいよう病                                       | 500～<br>1000倍  |                 | 葉芽発芽前<br>まで    |             |      |                  |
|                       |   | 500倍           |                 |                |             |      |                  |
|                       |   | キウイフルーツ        |                 | 500～<br>1000倍  |             |      |                  |
| マンゴー                  |   | 1000倍          |                 |                |             |      |                  |
| やまのいも<br>やまのいも(むかご)   |   | 葉渋病            | 500倍            | 100 ～<br>300 ℓ | ――          |      |                  |
| ブロッコリー                | 黒斑細菌病                                       |                |                 |                |             |      |                  |
| キャベツ                  | 黒腐病   |                |                 |                |             |      |                  |
| はくさい<br>レタス<br>非結球レタス | 軟腐病   |                |                 |                |             |      |                  |
| だいこん                  | 黒斑細菌病                                       |                |                 |                |             |      |                  |
| ばれいしょ                 | 疫病<br>軟腐病                                   |                |                 |                |             |      |                  |
| たまねぎ                  | 軟腐病<br>りん片腐敗病                               |                |                 |                |             |      |                  |
| ごぼう                   | 黒斑細菌病                                       |                |                 |                |             |      |                  |
| 茶                     | 炭疽病<br>もち病<br>赤焼病<br>網もち病<br>新梢枯死症<br>褐色円星病 | 200 ～<br>400 ℓ |                 | 摘採 14 日前<br>まで |             |      |                  |
|                       | だ い ず<br>えだまめ                               | 100 ～<br>300 ℓ | ――              |                |             |      |                  |
| いんげんまめ                | かさ枯病  |                |                 |                |             |      |                  |
| てんさい                  | 褐斑病   | 400～<br>500倍   |                 |                |             |      |                  |