

<b>シハロホップブチル粒剤</b> <b>クリンチャージャンボ</b>	<b>取扱メーカー：</b> 日産、日農、北興、住友化学  <b>原体メーカー：</b> ダウ
<b>成分：</b> シハロホップブチル〔フェノキシ酸系 PRTR・1種〕…1.8%	<b>性状：</b> 類白色細粒 水溶性パック入り（1パック50g）  <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> —

### 【品目特性】 .....

- クリンチャー1キロ粒剤の項参照。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

### 【使用上のポイント】 .....

- クリンチャー1キロ粒剤の項参照。
- 10a当り20個～30個のパックを一定間隔で投げ込む。

### 【薬効・薬害等の注意】 .....

- クリンチャー1キロ粒剤の項参照。
- 共通注意事項の5. 水稲除草剤散布 薬効・薬害等の注意を参照。
- 適用外作物（水稲以外のいね科作物、キャベツ）への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

### 【安全対策上の注意】 .....

- 甲殻類に影響を及ぼすので、使用時並びに使用後も注意。

### 【適用と使用法】 .....

作物名	適用 雑草名	使用時期	10a当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稲	ノビエ キシウスズメノヒエ アゼガヤ	移植後7日～ ノビエ4葉期 但し、収穫30日前まで	小包装(パック) 20個（1kg）	水田に 小包装 (パック) のまま 投げ入 れる。	2回以内 ※
		移植後25日～ ノビエ5葉期 但し、収穫30日前まで	小包装(パック) 30個（1.5kg）		
直播水稲	ノビエ	は種後10日～ ノビエ3葉期 但し、収穫30日前まで	小包装(パック) 20個（1kg）		
		は種後25日～ ノビエ4葉期 但し、収穫30日前まで	小包装(パック) 30個（1.5kg）		

※シハロホップブチルを含む農薬の総使用回数：3回以内