

クロチアニジン・イソチアニル水和剤 ツインターボ顆粒水和剤	取扱メーカー： クミカ 原体メーカー： 住友化学，住友化学・バイエル
成分： クロチアニジン〔ネオニコチノイド系〕……………15.0% イソチアニル〔チアジアゾールカルボキサミド系〕…20.0%	性状： 類白色水和性細粒 毒性： 普通物 消防法： ——

【適用と使用法】

作物名	適用病害虫名	10 a 当り 使用量	使用時期	使用方法	総使用回数
稲	いもち病 イネドロオイムシ イネミズゾウムシ	100g	移植時	ペースト肥料に混合し 側条施肥田植機で施用 する。	本剤 1 回 クロチアニジン 4 回以内 (直播では種時又は移植 時までの処理は 1 回以内， 本田での散布，空中散布， 無人ヘリ散布は合計 3 回以 内) イソチアニル 3 回以内 (直播では種時又は移植 時までの処理は 1 回以内， 本田では 2 回以内)

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	1 箱* 当り 使用液量	使用時期	使用 方法	総使用回数
稲 (箱育苗)	いもち病 イネドロオイムシ イネミズゾウムシ	100 倍	500 ml	移植 3 日前 ～移植当日	灌注	本剤 1 回 クロチアニジン 4 回以内 (移植時までの処理は 1 回 以内，本田での散布，空 中散布，無人ヘリ散布は 合計 3 回以内) イソチアニル 3 回以内 (移植時までの処理は 1 回 以内，本田では 2 回以内)

* 育苗箱は 30×60×3 cm，使用土壌約 5 ℓ