燐酸第二鉄粒剤 スラゴ	取扱メーカー: OAT, 日農, 三井アグロ 原体メーカー: 長瀬産業
成分:燐酸第二鉄水和物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	性状:淡緑色粒状 毒性:普通物 消防法:——

- ●薬剤を摂食したナメクジ・カタツムリは速やか に作物への加害を停止し, 死に至る。
- ●雨、湿気に強い製剤で、湿った場所でも効果を 発揮する。
- ●有機 JAS 使用可能農薬。
- ●有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一●眼に対して刺激性がある。 覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

●作物体上にかからないように作物周囲あるいは 株元の土壌表面に処理する。また作物体上に粒が 残った場合は払い落とす。

【適用と使用法】………

作物名	適用 場所	適用害虫名	使用量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用方法	燐酸第二鉄を含む 農薬の総使用回数
アフリカマイマイ、ハウ	温室ハウス圃場が	ナメクジ類 カタツムリ類	1∼5g/m²	発生時		ナメクジ類, カタツムリ類, アフリカマイ	_
		アフリカマイマイ	3∼5g/m²		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	マイ及びヒメ リンゴマイマ イの発生ある	
	10/4	ヒメリンゴマ イマイ	5g/m²				いは加害を受 けた場所又は 株元に配置